

Letsel aan het hoornvlies

U of uw kind is op de Spoedeisende Hulp van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) behandeld in verband met letsel aan het hoornvlies van het oog. In deze folder leest u informatie over letsel aan het hoornvlies en de behandeling ervan.

Hoornvlies

Het hoornvlies is het doorzichtige gedeelte van de buitenkant van het oog, waar licht doorheen komt. Het hoornvlies kan beschadigen door iets wat in of tegen het oog komt, zoals een tak, een ijzersplinter of een scherp voorwerp. Verschijnselen die hierbij kunnen optreden, zijn:

- pijn;
- tranen;
- gevoeligheid voor licht.

De arts van de Spoedeisende Hulp onderzoekt het oog. Als er iets in het oog zit, wordt dit verwijderd. Bij twijfel wordt een oogarts geraadpleegd.

Om irritatie te verminderen en een ontsteking van het hoornvlies te voorkomen, krijgt u soms oogzalf met een antibioticum.

Om het oog rust te geven, wordt een drukkend oogverband aangelegd. Hierdoor kunt u het oog niet meer bewegen. U kunt niet meer knipperen met het ooglid. Na vierentwintig uur mag het oogverband verwijderd worden. Hierna hoeft u het oog niet meer af te dekken, maar soms is het prettig dit wel te doen om het oog nog wat rust te geven en om te voorkomen dat u in het oog wrijft.

Meestal geneest het hoornvlies snel en zonder blijvende schade binnen één tot drie dagen. De eerste dag na de behandeling kunt u nog pijn ervaren. Paracetamol (500 mg) kan helpen.

Als de klachten na drie dagen aanhouden of verergeren, is het verstandig een oogarts te raadplegen.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, stel deze dan aan de verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Spoedeisende Hulp: (013) 221 80 10
Locatie ETZ Elisabeth
Route 53