

Open antrum

De inhoud van deze folder komt uit onze ETZ behandelwijzer app. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Welkom

Welkom

Een open antrum is een open verbinding tussen de mond en de neusbijholte. Die kan ontstaan nadat een kies verwijderd is. In deze app lees je over de behandeling om dit weer dicht te maken.

Meer informatie over: ETZ

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.

Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat.

Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

Algemene info

Na de behandeling

De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het kan zijn dat de volgende verschijnselen zich voordoen:

- **napijn;**
- **een gezwollen wang;**
- **enige temperatuursverhoging;**
- **bloedverlies uit de neus;**
- **het speeksel kan de eerste dag na de ingreep nog wat rood zijn.**

Meer informatie over: Na de behandeling

De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het kan zijn dat de volgende verschijnselen zich voordoen:

- napijn;
- een gezwollen wang;

- enige temperatuursverhoging;
- bloedverlies uit de neus;
- het speeksel kan de eerste dag na de ingreep nog wat rood zijn.

Pijnbestrijding

Heeft de MKA-chirurg geen pijnstiller voorgeschreven, dan kun je 1 a 2 tabletten paracetamol van 500 mg per stuk innemen, met een maximum van 3 gram (6 tabletten) per dag. Gebruik **geen** Aspirine® deze geven een grotere kans op nabloeding. Neem de pijnstiller voordat de verdoving is uitgewerkt, bijvoorbeeld direct bij thuiskomst.

Zwelling

Om zwelling te voorkomen, is het aan te raden op de eerste dag te koelen. Driemaal per dag kun je, gedurende 20 minuten, een plastic zakje met ijs tegen de wang houden waar de ingreep heeft plaatsgevonden. In plaats van een zakje ijs kun je ook een koelelement met daaromheen een washandje gebruiken.

Bloedverlies uit de neus

Het is mogelijk dat uit je neus bloed komt omdat de bovenste kaakholte in verbinding staat met de neusholte. Om de wond zo snel en goed mogelijk te laten genezen, is het zeer belangrijk dat er geen drukverschil tussen de mond, kaakholte en de neus ontstaat. Je mag beslist niet de neus snuiten, niezen, blazen, persen en bukken. Ook mag je de eerste vijf dagen na de behandeling **niet** roken. Dat heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.

Hechtingen

De wond is gehecht met materiaal dat na 1 - 2 weken vanzelf oplost. Als je niet oplosbare hechtingen hebt gekregen, krijg je een afspraak op de polikliniek MKA-chirurgie om de hechtingen te verwijderen.

Complicaties

Bij hoge koorts (hoger dan 38,5) en/of toename van de zwelling na 2 - 3 dagen, neem contact op met de polikliniek MKA-chirurgie. Neem ook contact op bij de volgende situaties.

Meer informatie over: Complicaties

Bel de polikliniek bij:

- een toenemend vol gevoel onder de ogen of een drukkend gevoel in de wang;
- viezigheid uit de neus;
- lucht of vloeistof van uit de mond in de neus.