

Behandeling extravasatie van jodiumhoudend contrastmiddel

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Wat is extravasatie?	1
De behandeling	1
Na de behandeling	1
Nazorg	1
Belangrijke telefoonnummers	2

Wat is extravasatie?

U heeft een onderzoek gehad waarbij contrastmiddel via een infuus in de ader is toegediend. Het contrastmiddel is onbedoeld (deels) buiten het bloedvat terecht gekomen. Dit heet extravasatie.

Extravasatie kan irritatie en/of pijn veroorzaken in de arm. Dit komt omdat er een zwelling is opgetreden die druk veroorzaakt op de omliggende weefsels. De huid kan in het begin zowel een rode en/ of bleke verkleuring geven, een brandend gevoel of jeuk kan optreden. Soms zijn er geen klachten.

De behandeling

De behandeling is in de onderzoekskamer al gestart. Er is een coldpack op de plek van de extravasatie gelegd. Herhaal dit thuis nog 4 maal met een duur van 15 minuten. Leg altijd een doek tussen de coldpack en uw arm.

Houdt de aangedane arm zoveel mogelijk omhoog, ter hoogte van het hart. Het liefst zo lang en vaak als kan.

Er is geen bewijs dat masseren helpt maar vaak wordt het als prettig ervaren om de plek van de extravasatie te masseren.

Wanneer de pijn erg vervelend is kunt u een pijnstiller (paracetamol) innemen.

Na de behandeling

De irritatie van de huid kan 1 à 2 dagen duren. Afhankelijk van de hoeveelheid contrastmiddel dat buiten het bloedvat is gelopen neemt de zwelling met een paar dagen af.

Nazorg

Als de klachten erger worden, pijn, roodheid en/of tintelingen in de arm of een doof gevoel krijgt, is het verstandig om contact op te nemen met uw huisarts.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00
Radiologie: (013) 221 03 70

Locatie ETZ Elisabeth
Route 72

Locatie ETZ Tweesteden
Route 77

Meer informatie over het inzien van uw eigen medische dossier kunt u vinden op: www.etz.nl/mijnetz

Radiologie, 43_1483 10-19

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.