

Flucloxacilline vrije fractie

Antibiotica

Versie 3

Datum 28-12-2021



Afnamemateriaal

Plasma



Buistype + volume + kleur

EDTA-buis met paarse dop

1 volle buis (6 mL)

Paars



Afnamecondities

Continue toediening:

Bij een continue infuus kan op elk moment een spiegel worden afgenomen, maar tenminste 24 uur na start infusie of dosiswijziging.

Intermitterende toediening:

Dalspiegel afnemen vlak voor de volgende gift.



Bepalingsfrequentie

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: Radboudumc Laboratorium Apotheek

<https://radboudumc.getincontrol.eu>

Normaal

0,5-20 mg/L

Effectiviteit (critically ill patients):

100% fT>MIC, overeenkomend met een vrije fractie >0,5 mg/L.

De grens 20 mg/L komt namelijk overeen met 10x de ECOFF (= de MIC-waarde die hoort bij de bovengrens van de wild type populatie). Boven deze grens valt geen extra therapeutische waarde meer te verwachten.

Ref [4]:

Acute Kidney Injury and neurotoxicity, but not acute liver injury, occurred significantly more frequently in patients with 100% fT>10%ECOFF than in patients who had lower flucloxacillin plasma concentrations [AKI 8/9 (89%) versus 14/41 (34%), respectively, P=0.007; neurotoxicity 7/9 (78%) versus 9/41 (22%), respectively, P=0.003; and acute liver injury 2/9 (22%) versus 2/41 (5%), respectively, P=0.1].

Toxisch

-

Klinische betekenis

-

-

Overige opmerkingen

For dosing recommendations, see the National Antibiotic Guidelines from the SWAB: <https://adult.swabid.nl/nl/node/1434>

TDM van flucloxacilline wordt niet standaard toegepast. In specifieke situaties kan TDM van nut zijn:

- Critically ill patients met moeilijk te behandelen infecties
- Gewijzigde farmacokinetiek (bv nierfunctiestoornissen, laag albumine)
- Vermoeden van toxiciteit door flucloxacilline

Flucloxacilline vrije fractie

-

Antibiotica

Versie 3

Datum 28-12-2021

Uitvoerende instelling**Laboratorium**

Stichting Radboud universitair medisch centrum Laboratorium Apotheek
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL**LIMS-code**

FLUCT

Bepalingsmethode

LC-MS/MS

Verzendconditie

VOLBLOED verzenden op kamertemperatuur (15-25 °C), 3 dagen stabiel.

PLASMA versturen op droogijs.

Bewaarconditie

Diepvries -80 °C (stabiliteit is getest bij -40 °C, niet bij -20 °C). Volbloed is 3 dagen stabiel bij kamertemperatuur (15-25 °C).

Opmerkingen

-

Contactpersoon

Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696

Referenties

1. TDM monografie flucloxacilline, NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (01-07-2021). Geraadpleegd: 03-08-2021.
2. KNMP Kennisbank, geraadpleegd: 03-08-2021.
3. Wallenburg, E., et al., Submitted for publication: A meta-analysis of protein binding of flucloxacillin in healthy volunteers and hospitalized patients. 2021: Submitted for publication.
4. Stephan Moser, et al., J Antimicrob Chemother 2021; 76: 1845–1854. doi:10.1093/jac/dkab089 Advance Access publication 8 April 2021.

ISO-15189 scope

ISO 15189:2012 (M300)

Scope

KF.TDM.02

NZA code

072898

Wijzigingen

20211228 VvW: Tekstuele aanpassingen.

20211124 KL: LIMS code OPSTP aangepast naar FLUCT.