

Het gebruik van Isordil[®] of nitrospray (Nitrolingual[®])

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Wat is nitrospray en Isordil[®]?	1
Voor wie zijn deze medicijnen bedoeld?	1
Hoe gebruikt u nitrospray of Isordil[®]?	1
Eventuele bijwerkingen	2
Tot slot	2
Belangrijke telefoonnummers	2

In deze folder leest u informatie over nitrospray (Nitrolingual[®])(voor onder de tong) en over Isordil[®] (tabletten voor onder de tong) waarbij onder andere aan bod komen wat nitrospray en Isordil[®] zijn, voor wie het bedoeld is, de gebruiksaanwijzingen en eventuele bijwerkingen.

Wat is nitrospray en Isordil[®]?

Nitrospray en Isordil[®] zijn medicijnen die ervoor zorgen dat de bloedvaten in het lichaam verwijden, waardoor de zuurstoftoevoer naar de hartspier verbetert. Hierdoor vermindert de zuurstofbehoefte van de hartspier. Omdat onder de tong zich veel bloedvaatjes bevinden wordt de werkzame stof snel opgenomen in het lichaam. Na gebruik moet de nitrospray of Isordil[®] al snel voor verlichting van de pijnklachten zorgen.

Voor wie zijn deze medicijnen bedoeld?

Nitrospray en Isordil[®] worden gebruikt bij mensen met angina pectoris. Angina pectoris voelt als een drukkende pijn op de borst, vaak straalt de pijn verder uit naar de linkerarm (soms de rechterarm), de kaken en soms naar uw rug of schouderbladen. Het kan voorkomen in rust en tijdens of na inspanning.

Hoe gebruikt u nitrospray of Isordil[®]?

Als u één of meerdere van de bovengenoemde klachten heeft, handelt u als volgt (zie ook de bijsluiter van Nitrolingual[®] of Isordil[®]).

Ga altijd zitten of liggen bij het gebruik van nitrospray of Isordil[®]!

Nitrospray:

Open de mond en ga met de punt van de tong naar het gehemelte.

Spray 1 à 2 keer een pufje nitrospray onder de tong en sluit daarna de mond. Als dit niet lukt, open dan de mond en spray tegen het wangslimvlies en sluit daarna de mond.

Als na 5 à 10 minuten de klachten niet verminderen, spray dan nogmaals 1 à 2 keer een pufje nitrospray onder de tong of tegen het wangslimvlies.

Zijn de klachten na ongeveer 5 à 10 minuten niet weg, bel dan uw huisarts of 112.

Isordil®:

Open de mond en ga met de punt van de tong naar het gehemelte.

Leg 1 tabletje Isordil® onder de tong en sluit daarna de mond.

Als na 5 à 10 minuten de klachten niet verminderen, dan nogmaals 1 tabletje Isordil® onder de tong leggen.

Zijn de klachten na 5 à 10 minuten niet weg, bel dan uw huisarts of 112.

Eventuele bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van nitrospray en Isordil® zijn hoofdpijn, duizeligheid of daling van de bloeddruk, **ga daarom altijd liggen of zitten!**

Voor andere bijwerkingen kunt u het beste de bijsluiter lezen of raadpleeg uw huisarts of apotheek.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met verpleegafdeling Cardiologie of met uw huisarts of de Huisartsenpost.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth

Etage F, kamer 17 t/m 28 (F2): (013) 221 30 32

Locatie ETZ TweeSteden

Afdeling 6A: (013) 221 53 76

Afdeling 6B: (013) 221 53 67

Cardiologie, 43.556 11-18

Copyright® ETZ

Afdeling Communicatie

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.