

## Medicatie die voorafgaand aan Spirometrie of de bepaling van de histamine drempel van de longen gestopt moet worden

De volgende medicatie moet voor het onderzoek 'de bepaling van de histamedrempel van de longen', gestopt worden:

### Inhalatiemedicatie (pufjes)

Luchtwegverwijders (sympaticomimetica en parasympaticolytica en combinatiepreparaten)

Kortwerkende luchtwegverwijders tenminste 12 uur voor de test stoppen:

fenoterol	Berotec®
fenoterol / ipratropium	Berodual®
ipratropium	Atrovent®
salbutamol	Airomir®, Ventolin®
salbutamol / ipratropium	Combivent®
terbutaline	Bricanyl®

Langwerkende luchtwegverwijders tenminste 24 uur voor de test stoppen:

formoterol	Foradil®, Oxis®
salmeterol	Serevent®

(Extra)langwerkende luchtwegverwijders tenminste 48 uur voor de test stoppen:

tiotropium	Spiriva®
------------	----------

### Mestcelstabilatoren, luchtwegmedicatie:

cromoglycinezuur	Lomudal® Natriumcromoglicaat	<input type="checkbox"/> 10 dagen stoppen <input type="checkbox"/> gewoon doorgebruiken
nedocromil	Tilade®	<input type="checkbox"/> 10 dagen stoppen <input type="checkbox"/> gewoon doorgebruiken

**Inhalatiesteroiden:**

beclomethason	Aerobec <sup>®</sup> , Qvar <sup>®</sup>	<input type="checkbox"/> 10 dagen stoppen <input type="checkbox"/> gewoon doorgebruiken
budesonide	Pulmicort <sup>®</sup>	<input type="checkbox"/> 10 dagen stoppen <input type="checkbox"/> gewoon doorgebruiken
ciclesonide	Alvesco <sup>®</sup>	<input type="checkbox"/> 10 dagen stoppen <input type="checkbox"/> gewoon doorgebruiken
formoterol/ beclometason	Foster <sup>®</sup>	<input type="checkbox"/> 10 dagen stoppen <input type="checkbox"/> 24 uur stoppen
formoterol/fluticason	Flutiform <sup>®</sup>	<input type="checkbox"/> 10 dagen stoppen <input type="checkbox"/> 24 uur stoppen
fluticason	Flixotide <sup>®</sup>	<input type="checkbox"/> 10 dagen stoppen <input type="checkbox"/> gewoon doorgebruiken
formoterol/budesonide	Symbicort <sup>®</sup>	<input type="checkbox"/> 10 dagen stoppen <input type="checkbox"/> 24 uur stoppen
salmeterol/fluticason	Seretide <sup>®</sup>	<input type="checkbox"/> 10 dagen stoppen <input type="checkbox"/> 24 uur stoppen

**Tabletten**

Tabletten (onder andere antihistaminica) die tenminste 4 dagen voor het verrichten van de test gestaakt moeten worden.

acrivastine	Semprex <sup>®</sup>	fexofenadine	Telfast <sup>®</sup>
alimemazine	Nedeltran <sup>®</sup>	hydroxyzine	Atarax <sup>®</sup>
cetirizine	Zyrtec <sup>®</sup>	ketotifen	Zaditen <sup>®</sup> (5 dagen stop)
cimetidine		levocetirizine	Xyzal <sup>®</sup>
cinnerazine		loratadine	Allerfree <sup>®</sup> / Claritin <sup>®</sup>
clemastine	Tavegil <sup>®</sup>	mebhydroline	
cromoglicinezuur	Nalcrom <sup>®</sup>	meclozine	Suprimal <sup>®</sup> / Emesafene <sup>®</sup>
cyclizine		mizolastine	Mizollen <sup>®</sup>
cyproheptadine	Periactin <sup>®</sup>	montelukast	Singulair <sup>®</sup>
desloratadine	Aerius <sup>®</sup>	oxatomide	Tinset <sup>®</sup>

dexchlorfeniramine	Polaramine®	oxomemazine	
dimenhydrinaat		promethazine	
dimetindeen	Fenistil®	ranitidine rupatadine	Zantac® Rupafin®
ebastine	Kestine®	terfenadine	Triludan®

### Tabletten tenminste 48 uur voor de test stoppen:

Xhantinederivaten

theofylline	Theolair®, Euphylong®
-------------	-----------------------

### Neusdruppels

De volgende neusdruppels (met antihistaminica) mogen op de dag van de test NIET worden gebruikt:

azelastine neusspray	Otrivin® neusallergie / Allergil®
levocabastine	Livocab®

### Oogdruppels

De volgende oogdruppels (met antihistaminica) mogen op de dag van de test NIET worden gebruikt:

azelastine	Allergodil®, Oculastin®	levocabastine	Livocab®
emedastine	Emadine®	olopatadine	Opatanol®
ketotifen	Zaditen®		

Medicatie die voorafgaand aan spirometrie gestopt moet worden:

Inhalatiemedicatie (pufjes):

Luchtwegverwijders (sympaticomimetica en parasymphaticolytica en combinatie-preparaten):

Kortwerkende luchtwegverwijders tenminste 12 uur voor de test stoppen:

fenoterol	Berotec®
fenoterol/ipratropium	Berodual®
ipratropium	Atrovent®
salbutamol	Airomir®/Ventolin®

salbutamol/ipratropium	Combivent®
terbutaline	Bricanyl®

Langwerkende luchtwegverwijders tenminste 24 uur voor de test stoppen:

formoterol	Foradil®, Oxis®
formoterol/beclometason	Foster®
formoterol/budesonide	Symbicort®
salmeterol	Serevent®
salmeterol/fluticason	Seretide®

(Extra)langwerkende luchtwegverwijder tenminste 48 uur voor de test stoppen:

Tiotropium	Spiriva
------------	---------

## Tabletten

Xanthinederivaten tenminste 48 uur voor de test stoppen:

theofylline	Theolair® <sup>□</sup> , Euphylong®
-------------	-------------------------------------

### Instructie voorafgaand aan NO meting

- Eén uur voor de test:
- géén inspanning;
- niet eten;
- niet roken.

### Tot slot

Mocht u na het lezen van deze brochure vragen hebben, neem dan op werkdagen contact op met de polikliniek Allergologie.

## Belangrijke telefoonnummers

**ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):** (013) 221 00 00

**Allergiecentrum:** (013) 221 00 20  
**Locatie ETZ Elisabeth**  
**Route 35**

Allergiecentrum, 41.154 09-19

Copyright® ETZ

Afdeling Communicatie

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.