

Apomorfine therapie bij de ziekte van Parkinson

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Waarom Apomorfine therapie?	1
Apomorfine	1
Toediening	1
Dag opname voor testen effect Apomorfine	2
Tot slot	3
Belangrijke telefoonnummers	3

Waarom Apomorfine therapie?

Er is door uw neuroloog en/of gespecialiseerd verpleegkundige met u gesproken over het starten met de Apomorfine therapie. Apomorfine therapie is een aanvullende behandeling. Als u ervaart dat de medicijnen die u voor uw Parkinson niet meer het gewenste effect geven is deze therapie mogelijk naast de medicijnen in tabletvorm,

Apomorfine kan een oplossing in bieden aan patiënten die:

- meerdere en/of langdurige off-periodes kennen, die onvoldoende op de Parkinson medicijnen reageren;
- veel last blijven houden van periodes van grote (over)beweeglijkheid afgewisseld met stijfheid;
- overgevoelig zijn voor of veel bijwerkingen hebben van de Parkinson medicijnen.

Apomorfine therapie krijgt u per keer toegediend met een injectiepen of continue via een pompje.

Apomorfine

Apomorfine is een stof die van morfine is afgeleid, maar die niet de pijnstillende en verslavende werking van morfine heeft. Apomorfine kan niet in tabletvorm worden gegeven. Het wordt via een naaldje net onder de huid toegediend. De stof wordt snel in de hersenen opgenomen, waardoor u binnen ongeveer 10 minuten resultaat heeft. Het werkt vervolgens 45 tot 60 minuten door na toediening. Het is geen vervanging voor de Parkinson medicijnen, maar mogelijk wel voor het aantal Parkinson medicijnen dat u neemt.

Toediening

APO-go pen

De APO-Go pen is een kant en klare injectiepen waar Apomorfine in zit. Door de doseerknop te draaien kan de voorgeschreven hoeveelheid ingesteld worden.

De pen is maximaal 48 uur houdbaar en is na die tijd niet meer te gebruiken. U kunt de APO-Go pen gebruiken als u meerdere (maximaal vijf) en/of onvoorspelbare



off-periodes heeft op een dag, die onvoldoende op de Parkinson medicijnen reageren.

Apomorfine pomp

De Apomorfine pomp is een klein kastje waarop een spuit wordt gedraaid waar de Apomorfine in zit. Aan het einde van de spuit komt een slangetje, die aan de canule wordt gekoppeld, die net onder de huid is geprikt. De canule moet elke 48 uur worden vervangen en het slangetje elke 24 uur. De Apomorfine pomp is mogelijk geschikt voor u, als u meerdere en/of langdurige, voorspelbare en/of onvoorspelbare off-periodes heeft op een dag. Met de pomp krijgt u de Apomorfine continu toegediend.



Voor het starten met Apomorfine

Voorafgaand aan de behandeling met Apomorfine, krijgt u een aantal vooronderzoeken op de polikliniek en wordt er een dagopname gepland om het effect van de Apomorfine te testen. De gespecialiseerd verpleegkundige neemt met u alle informatie door, informeert naar uw verwachtingen en beantwoordt uw vragen.

De vooronderzoeken zijn:

- een geheugentest door de gespecialiseerd verpleegkundige
- een bloeddruk meting liggend en staand door de gespecialiseerd verpleegkundige
- een ECG (hartfilmpje) op de afdeling Cardiologie route 56 (locatie ETZ Elisabeth)
- bloedprikken bij de bloedprikdienst route 21 (locatie ETZ Elisabeth).

Als uit de vooronderzoeken blijkt dat Apomorfine niet toegepast kan worden in uw situatie, stopt het traject hier. Als de vooronderzoeken goed zijn verlopen wordt er in overleg met u een datum gepland voor het testen van het effect van Apomorfine en het bepalen van de beste dosering in uw situatie. De gespecialiseerd verpleegkundige bespreekt met u de voorbereiding over het gebruik van medicijnen voor en op de testdag. U start drie dagen voor het testen met domperidon, dit is om mogelijke bijwerkingen van Apomorfine (misselijkheid en bloeddruk daling) te voorkomen. U hoort de tijd van stoppen en herstarten van uw Parkinson medicijnen op de testdag. Om het effect van de Apomorfine goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat u komt zonder dat u uw gebruikelijke Parkinson medicijnen heeft ingenomen (wel de domperidon).

Dag opname voor testen effect Apomorfine

Het testen gebeurt in het ETZ op de verpleegafdeling Neurologie op locatie ETZ Elisabeth. Op de dag van het testen meldt u zich op de afgesproken tijd op de verpleegafdeling.

Tijdens de testdag wordt ieder uur een dosis Apomorfine met de APO-Go pen toegediend en wordt ieder uur met een aantal terugkerende testen beoordeeld wat het effect hiervan is op uw klachten. Er wordt aan u gevraagd of u verbetering, verslechtering of bijwerkingen ervaart. Dit wordt getest tot het beste effect is behaald of tot er bijwerkingen optreden.

APO-Go pen

Wanneer u in aanmerking komt voor een apomorfine pen, wordt na de testen in overleg met de neuroloog bepaald wat uw dosering wordt en hoeveel keer per dag u de APO-Go pen mag gebruiken. Hierna gaat u weer de normale dosering Parkinson medicijnen innemen en gaat u met ontslag naar huis. U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek Neurologie binnen 4 weken.

Apomorfine pomp

Wanneer u in aanmerking komt voor de Apomorfine pomp, wordt na de testen in overleg met de neuroloog de pomp aangesloten. De dosering wordt geleidelijk opgebouwd, afhankelijk van de parkinson klachten en het effect. Om deze reden moet u een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. Tijdens de ziekenhuisopname en daarna tijdens de policonroles wordt er gekeken of het aantal Parkinson medicijnen kan worden verminderd. Het heeft tijd nodig om een goede balans hierin te vinden.



Voor verdere toelichting over het gebruik van de APO-Gopen en Apomorfine pomp, zie de daarvoor beschikbare folders en instructiekaarten.

ApotheekZorg

Levering van de APO-Go pen, Apomorfine en benodigdheden met betrekking tot de pomp, gaat via de firma ApotheekZorg. Vanuit Apotheekzorg is een verpleegkundige betrokken die eventueel tijdens de opstart in het ziekenhuis aanwezig is. Verpleegkundigen in dienst van ApotheekZorg zijn of kunnen betrokken worden bij de gehele behandeling. Zij zijn 24/7 bereikbaar voor vragen en/of problemen. Zij komen indien nodig ook aan huis.

Vergoeding zorgverzekeraar

Behandeling met Apomorfine wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw zorgverzekeraar. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Tot slot

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend neuroloog of gespecialiseerd verpleegkundige.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):
Neurocentrum, polikliniek Neurologie:
 Route 42

(013) 221 00 00

(013) 221 01 40

Gespecialiseerd verpleegkundige:

(013) 221 01 40

Neurologie, 1602 10-20

Copyright© ETZ

Afdeling Communicatie

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.