

De inhoud van deze folder komt uit onze ETZ behandelwijzer app. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

## Welkom

---

### Welkom

**Welkom in het ETZ. In deze app vindt u alle informatie over uw bronchoscopie.**

#### Meer informatie over: ETZ

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners in de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.

Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. We gaan met patiënten in gesprek over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren we onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

## Algemene informatie

---

### Wat is een bronchoscopie?

**Binnenkort wordt u verwacht op de endoscopie-afdeling voor een bronchoscopie.**

#### Meer informatie over: Wat is een bronchoscopie?

Een bronchoscopie is een onderzoek van de luchtwegen met behulp van een zogenaamde bronchoscoop. Een bronchoscoop is een dunne flexibele slang met een doorsnee van ongeveer 0,5 cm, die aangesloten is op een sterke lichtbron. Met dit apparaat kan de specialist in de luchtwegen kijken. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

## Vorbereiding op het onderzoek

---

### Vorbereiding op het onderzoek

**Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn vanaf 24 uur 's nachts. Dat betekent dat u niet meer mag eten, drinken of roken.**

## Medicatie

**U mag uw medicijnen in de ochtend met een slokje water innemen.**

### Meer informatie over: Medicatie

- Uw dokter heeft uw medicatielijst. Toch vragen wij u een medicatiepaspoort of originele verpakking van uw medicijnen mee te nemen naar het onderzoek.
- Als u bloedverdunners gebruikt, kijkt u in overleg met de arts of u het gebruik hiervan voor het onderzoek tijdelijk moet stoppen.
- Als u nog andere medicijnen gebruikt, moet u het gebruik in overleg met de arts bespreken. Dit geldt ook als u diabetes (suikerziekte) heeft en insuline moet spuiten of tabletten moet innemen
- Gebruikt u inhalaties of puffers, dan moet u deze innemen vóór het onderzoek.

## Het onderzoek

---

### Waar vindt het onderzoek plaats

- **ETZ Elisabeth: afdeling Endoscopie; etage F**
- **ETZ Tweesteden: afdeling Endoscopie; routenummer 59**

**Neem plaats in de wachtkamer nadat u zich hebt aangemeld bij de aanmeldzuil in de centrale hal.**

### Hoe verloopt het onderzoek

**Voor het onderzoek worden uw luchtwegen verdoofd.**

### Meer informatie over: Hoe verloopt het onderzoek

Als u een gebitsprothese heeft moet u deze voor het onderzoek uit doen.

#### Verdooving

Tijdens het verdoven van de luchtwegen krijgt u zuurstof toegediend. Eerst wordt de keelholte verdoofd met een spray. Hiervoor moet u uw tong ver uitsteken en vastpakken met een gaasje. Het kan dat u de eerste keren daar flink van moet hoesten; alsof u zich verslikt. Als de keelholte verdoofd is, wordt de verdooving dieper in uw luchtpijp gesprayd. Na enkele keren sprayen wordt die hoestprikkel onderdrukt en bent u goed verdoofd.

#### Het inbrengen van de endoscoop

Na de verdooving ligt u op een onderzoektafel. De scopie-verpleegkundige houdt uw tong vast en de longarts brengt de bronchoscoop in de luchtwegen. Deze gaat langs de stembanden en komt uit in de luchtpijp. Met de bronchoscoop bekijkt de longarts de grootste vertakkingen van de luchtpijp. Hij onderzoekt het aanwezige slijmvlies op structuur, de aanwezigheid van ontstekingen en eventuele

afwijkingen. Tijdens het onderzoek kunt u gewoon doorademen door de neus en de mond. Het kan nodig zijn dat er wat slijm wordt afgezogen voor bacteriologisch onderzoek. Dit afzuigen gebeurt via de bronchoscoop. Ook kunnen kleine stukjes weefsel worden weggenomen voor onderzoek onder de microscoop. Slijm of weefsel wegnemen is pijnloos. Tijdens het onderzoek krijgt u een knijpertje op de vinger om uw zuurstofgehalte en hartslag te bewaken.

## Na het onderzoek

---

### Na het onderzoek

**Na het onderzoek moet u 1,5 uur nuchter blijven. Uw keelholte is nog verdoofd. Daardoor kunt u niet goed slikken. Na 1,5 uur probeert u voorzichtig een slokje water. Als u dat goed kunt doorslikken, mag u weer eten en drinken. Als u zich verslikt, moet u nog wat langer wachten, net zolang tot u weer goed kunt slikken.**

### Meer informatie over: Na het onderzoek

- Het kan gebeuren dat u wat bloederig slijm ophoest. Dit is normaal en gaat meestal snel weer over. Neem contact op als dit bloedverlies toeneemt of aanhoudt. Neem ook contact op, als u na het onderzoek koorts krijgt, hoger dan 38,5°C. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek longgeneeskunde of (buiten kantoor tijden) met de spoedeisende hulp van het ETZ Elisabeth ziekenhuis.
- Als u bloedverdunders gebruikt krijgt u na het onderzoek te horen wanneer u deze mag herstarten.
- We adviseren u om onder begeleiding weer naar huis te gaan.

### De uitslag

**Soms kan de longarts u direct na het onderzoek de voorlopige uitslag geven. Als er weefsel of slijm voor onderzoek is weggenomen, duurt het een paar dagen voor de uitslag bekend is. U maakt dan een afspraak op de polikliniek voor de uitslag.**

## Tot slot

---

### Wanneer contact opnemen

**Als u niet naar uw afspraak kunt komen, bel dan de polikliniek Longgeneeskunde. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken. Ook als u vragen heeft kunt u bellen met de polikliniek tussen 09.00 en 16.30 uur.**