

(Gastro) enterostomie

Omleidingsoperatie van maag met dunne darm

1. Inleiding

Binnenkort ondergaat u een "omleidingsoperatie" in het ETZ TweeSteden of het ETZ Waalwijk. In deze folder leest u informatie over de operatie en krijgt u een aantal richtlijnen en adviezen die bijdragen aan uw herstel. In de informatiefolder "ETZ zorginformatie" leest u alles over de voorbereidingen en gang van zaken rondom uw operatie.

2. Oorzaak aandoening/aanleiding behandeling

Wanneer een tumor de maaguitgang blokkeert en niet verwijderd kan worden, kan de chirurg een verbinding maken tussen de maag en de dunne darm, om er op die manier voor te zorgen dat het voedsel vanuit de maag naar de darmen kan blijven doorgaan. Dit wordt een 'overloop' genoemd. Andere benamingen zijn omleidingoperatie, bypassoperatie of gastro-enterostomie. De gastro-enterostomie is een palliatieve operatie (zorg gericht op verzachting en verlichting). De tumor blijft in het lichaam dus de chirurg kan u niet genezen.

3. Behandeling

Tijdens de operatie zal de chirurg een verbinding maken tussen de maag en de dunne darm om zo de passage van voedsel weer mogelijk te maken en te waarborgen. De operatie duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Om de narcose toe te dienen krijgt u een infuusnaald in de arm, deze infuusnaald wordt hierna gebruikt voor vochttoediening en voor het toedienen van medicatie. De operatie wordt indien mogelijk door middel van een kijkoperatie uitgevoerd. Bij een kijkoperatie worden via een aantal wondjes in de buikwand instrumenten en een camera, die verbonden is met een tv monitor, naar binnen gebracht. De arts kan via de camera zijn handelingen zien op het tv-scherm.

4. Na de operatie

Pijnbestrijding

Na de operatie krijgt u 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol. Het is belangrijk deze pijnstillers in te nemen, ook als u geen pijn heeft, zodat u een zogenoemde spiegel van de paracetamol in uw bloed opbouwt. Om een goede indruk te krijgen van de kwaliteit van de pijnbestrijding wordt u gevraagd bij te houden hoeveel pijn u ervaart met een zogenaamde pijnscore.

Sondes, katheters en drains

- Voor de pijnbestrijding heeft u een infuus in uw arm voor vochttoediening.
- Tijdens de operatie is ook een slangetje in de blaas (urinekatheeter) ingebracht.
- Verder zit er een plastic slangetje in uw neus dat via de slokdarm in de maag ligt en ervoor zorgt dat het overtollige maagsap kan worden afgezogen (maagsonde). Hierdoor loopt u minder kans om misselijk te worden. De maagsonde kan irritatie in de keel veroorzaken en wordt zo snel mogelijk na de operatie weer verwijderd.
- Ook krijgt u zuurstof toegediend via een slangetje in uw neus.

Voeding

Na de operatie mag u, in opdracht van de arts, langzaam aan weer beginnen met drinken en gaat u via vloeibare voeding over op normale, vaste voeding. De diëtiste zal u indien nodig gedurende de opname begeleiden op het gebied van voeding.

- Om uw vochtinhouding weer op peil te brengen is het belangrijk dat u snel weer drinkt.
- De anesthesioloog schrijft middelen voor om misselijkheid en braken tegen te gaan. Toch kan misselijkheid niet altijd voorkomen worden. Vooral de grootte van de operatie en de reactie van uw lichaam op de operatie bepalen of u misselijk wordt.
- Als u niet misselijk bent, probeer dan minstens een halve liter te drinken na de operatie.

Beweging

Bewegen is niet alleen belangrijk om trombose te voorkomen, maar ook om verlies van spierkracht tegen te gaan. Bovendien kunt u beter ademen als u rechtop zit en dat verkleint bijvoorbeeld weer de kans op luchtweginfecties.

Na de operatie is het belangrijk dat u zo snel mogelijk weer in beweging komt. De avond van de operatiedag komt u onder begeleiding van de verpleegkundige voor het eerst uit bed of mag u even op de bedrand zitten indien u hiertoe in staat bent. Lukt dit niet dezelfde avond, dan helpt de verpleegkundige u de dag erna uit bed. Verder krijgt u adviezen over het uitbreiden van uw activiteiten.

5. Mogelijke complicaties na ingreep

Na iedere operatie kunnen er complicaties optreden. Zo is er ook bij een operatie aan de maag een kans op complicaties aanwezig zoals trombose, longontsteking, nabloeding en wondinfecties. Specifiek voor deze operatie gelden de volgende complicaties;

- Slechte heling van de aangelegde omleiding ("naadlekkage").
- Het vertraagd opgang komen van de maag waardoor de maagsonde soms wat langer in moet blijven.

6. Na de behandeling (leefregels)

- De eerste weken thuis kan de operatiewond nog gevoelig zijn of wat zwellen. Bij de eerste controle op de polikliniek wordt het herstel van de wond gecontroleerd.
- Uw pijnklachten zijn nog niet weg zijn als u thuis bent. U merkt dat, wanneer u zich wat meer gaat inspannen, u mogelijk wat meer pijnklachten krijgt. U kunt hiervoor 3 tot 4 maal per dag 1 of 2 tabletten paracetamol gebruiken.
- U mag gewoon douchen met de wond.
- Neem bij klachten gerust contact op met de polikliniek Chirurgie (contactgegevens vindt u achter aan de folder).

7. Heeft u nog vragen?

Vóór de operatie

- Bij medische vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie.
- Bij vragen over de verdoving tijdens de operatie kunt u contact opnemen met de polikliniek anesthesiologie.
- Als u voor het afgesproken onderzoek of ingreep bent verhinderd, verzoeken wij u het planbureau daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. In uw plaats kan dan iemand anders worden geholpen.
- Wanneer u koorts heeft, kan de behandeling niet plaatsvinden. Als u twijfelt of u geholpen kunt worden, neem dan - in het geval van een geplande operatie in dagbehandeling - contact op met de dagbehandeling of anders met de polikliniek chirurgie.

Na de operatie

Wanneer zich thuis na de operatie (acute) problemen voordoen, kunt u contact opnemen met:

- Uw huisarts of huisartsenpost;
- De polikliniek chirurgie;
- Buiten kantooruren met de spoedeisende hulp.

8. Waar moet ik in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis zijn?

Polikliniek chirurgie ETZ TweeSteden (Route 72)	013-4655580
Polikliniek chirurgie ETZ Waalwijk (Route poli Noord)	013-4655580
Planbureau chirurgie ETZ TweeSteden (Route 72/73)	013-4654397
Polikliniek anesthesiologie ETZ TweeSteden (Route 88)	013-4655171
Polikliniek anesthesiologie ETZ Waalwijk (Route poli Noord)	0416-682732
Dagbehandeling ETZ TweeSteden (Route 89, 1 ^e verd.)	013-4655516
Dagbehandeling ETZ Waalwijk (Afdeling 2, 2 ^e verdieping)	0416-682316
Verpleegafdeling chirurgie 3A ETZ TweeSteden (3 ^e verd.)	013-4655357
Verpleegafdeling chirurgie 3B ETZ TweeSteden (3 ^e verd.)	013-4655352
Spoedeisende Hulp (alléén ETZ TweeSteden)	013-4655216

9. Tot slot

Wij doen er alles aan om te zorgen dat u naar alle tevredenheid wordt geholpen. Het kan echter voorkomen dat dingen gebeuren waarover u niet tevreden bent. Uw ontevredenheid kunt u aangeven bij de verantwoordelijke medewerker of u kunt de klachtenfunctionaris benaderen door het klachtenformulier in te vullen op de website (www.etz.nl). De klachtenfunctionaris zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Kunt u niet overweg met internet? Dan kunt u bellen met of schrijven naar de klachtenfunctionaris:

Tel.nr.: 06-53781700

ETZ TweeSteden
Klachtenfunctionaris
Postbus 90107
5000 LA Tilburg