

Eten en medicijnwijzer

De inhoud van deze folder komt uit onze ETZ behandelwijzer app. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Inleiding

Eten, drinken en medicijnen reageren op elkaar

Bepaald eten kan de werking van medicijnen afremmen. Het werkt ook andersom. Dat bepaalde medicijnen ervoor zorgen dat het voedingsmiddel onvoldoende opgenomen wordt door je lichaam.

Meer informatie over: Eten, drinken en medicijnen reageren op elkaar

Door rekening te houden met eten, drinken en het medicijn dat je gebruikt kunnen bijwerkingen van medicijnen afnemen of voorkomen worden. Daarom stemmen wij eten, drinken en medicijnen op elkaar af. Informeer je behandeld arts en de eigen apotheek over de medicijnen die je slikt. Ben je bepaalde medicijnen anders gaan gebruiken? Misschien neem je voedingssupplementen of kruidenpreparaten, die je bijvoorbeeld bij de drogist koopt? Deze kunnen invloed hebben op je medicijnen. Geef het daarom altijd door aan je apotheek, huisarts en arts in het ziekenhuis als er iets is veranderd in je medicijngebruik. Je eigen apotheek adviseert je zodat de medicijnen goed hun werk kunnen doen.

Overzicht per medicijn

Inleiding

In het overzicht hieronder kun je per medicijn zien hoe je het in moet nemen en waarmee het medicijn reageert.

acenocoumarol

Meer informatie over: acenocoumarol

Acenocoumarol

Hoe neem ik het in?

Innemen met water, heel doorslikken, niet gelijktijdig met alcohol innemen.

Extra advies

Bevat lactose, past niet in een strikt lactosevrij dieet. Meld gebruik van Sint janskruid, ginkgo biloba en

knoflooksupplementen bij uw apotheker, trombosedienst en diëtist.

Dit medicijn reageert met

Vitamine K. Alcohol. Sint-janskruid. Ginseng. Danshen. Ginkgo biloba. Knoflook supplement.

Advies voor gehele behandeling

Ginkgo biloba- en Ginseng supplement niet gebruiken. Danshen supplementen beperkt gebruiken. Drink maximaal 1-2 glazen alcohol per dag. Wees matig met het gebruik van vitamine K rijke voedingsmiddelen. Overleg met uw apotheker of u Sint-Janskruid moet stoppen. 7 dagen voor OK stoppen met knoflookpreparaten i.v.m. postoperatieve bloedingsrisico.

acetylsalicylzuur

acetylsalicylzuur

Meer informatie over: acetylsalicylzuur

acetylsalicylzuur

Hoe neem ik het in?

In water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken. Niet gelijktijdig met alcohol innemen.

Extra advies

Bevat lactose, past niet in een strikt lactosevrij dieet. Meld het gebruik van ginkgo biloba en ginseng bij uw apotheker, trombosedienst en diëtist.

Dit medicijn reageert met

Alcohol. Ginkgo biloba. Ginseng.

Advies voor gehele behandeling

Ginkgo biloba- en Ginseng supplement niet gebruiken. Niet gelijktijdig innemen met alcohol.

clopidogrel

clopidogrel

Meer informatie over: clopidogrel

clopidogrel

Alle informatie

clopidogrel

clopidogrel

Eten, drinken en medicijnen reageren op elkaar

Door rekening te houden met eten, drinken en het medicijn dat je gebruikt kunnen bijwerkingen van medicijnen afnemen of voorkomen worden. Daarom stemmen wij eten, drinken en medicijnen op elkaar af. Informeer je behandeld arts en de eigen apotheek over de medicijnen die je slikt. Ben je bepaalde medicijnen anders gaan gebruiken? Misschien neem je voedingssupplementen of kruidenpreparaten, die je bijvoorbeeld bij de drogist koopt? Deze kunnen invloed hebben op je medicijnen. Geef het daarom altijd door aan je apotheek, huisarts en arts in het ziekenhuis als er iets is veranderd in je medicijngebruik. Je eigen apotheek adviseert je zodat de medicijnen goed hun werk kunnen doen.

acenocoumarol

Acenocoumarol

Hoe neem ik het in?

Innemen met water, heel doorslikken, niet gelijktijdig met alcohol innemen.

Extra advies

Bevat lactose, past niet in een strikt lactosevrij dieet. Meld gebruik van Sint janskruid, ginkgo biloba en knoflooksupplementen bij uw apotheker, trombosedienst en diëtist.

Dit medicijn reageert met

Vitamine K. Alcohol. Sint-janskruid. Ginseng. Danshen. Ginkgo biloba. Knoflook supplement.

Advies voor gehele behandeling

Ginkgo biloba- en Ginseng supplement niet gebruiken. Danshen supplementen beperkt gebruiken. Drink maximaal 1-2 glazen alcohol per dag. Wees matig met het gebruik van vitamine K rijke voedingsmiddelen. Overleg met uw apotheker of u Sint-Janskruid moet stoppen. 7 dagen voor OK stoppen met knoflookpreparaten i.v.m. postoperatieve bloedingsrisico.

acetylsalicylzuur

acetylsalicylzuur

Hoe neem ik het in?

In water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken. Niet gelijktijdig met alcohol innemen.

Extra advies

Bevat lactose, past niet in een strikt lactosevrij dieet. Meld het gebruik van ginkgo biloba en ginseng bij uw apotheker, trombosedienst en diëtist.

Dit medicijn reageert met

Alcohol. Ginkgo biloba. Ginseng.

Advies voor gehele behandeling

Ginkgo biloba- en Ginseng supplement niet gebruiken. Niet gelijktijdig innemen met alcohol.