

Hydroxychloroquinesulfaat

Plaquenil®

Reumatologie

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Werking	1
Gebruik	1
Bijwerkingen	1
Aanvullende informatie	2
Tot slot	2
Belangrijke telefoonnummers	2

In overleg met u heeft uw behandelend arts u het geneesmiddel hydroxychloroquinesulfaat, ofwel Plaquenil® voorgeschreven. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw arts, verpleegkundig specialist, apotheker of verpleegkundig reumaconsulent terecht.

Werking

Hydroxychloroquinesulfaat is een anti-reumaticum. Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor zwelling en pijn van de gewrichten en bovendien ochtendstijfheid. Hydroxychloroquinesulfaat heeft een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsbeschadigingen.

Hydroxychloroquinesulfaat werkt langzaam; het kan drie tot zes maanden duren voordat effect merkbaar wordt. Uw arts adviseert u dan ook meestal om naast hydroxychloroquinesulfaat, tijdelijk andere pijnstillers en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

Gebruik

Hydroxychloroquinesulfaat wordt toegediend in dragees van 200 mg en wordt in één of twee doseringen per dag ingenomen. U moet de dragees na de maaltijd of voor de nacht innemen met water en ze in hun geheel doorslikken.

Bijwerkingen

Bij gebruik van hydroxychloroquinesulfaat kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

- Misselijkheid, braken en/of diarree; deze verschijnselen zijn meestal van voorbijgaande aard.
- Huiduitslag en jeuk; mede onder invloed van zonlicht.
- Sufheid, vermoeidheid en/of hoofdpijn.
- Oogproblemen. Hierdoor kan het zijn dat uw behandelend arts u doorverwijst naar een oogarts.

Als één of meerdere van bovenstaande verschijnselen bij u optreden, moet u contact opnemen met uw behandelend arts of huisarts.

Aanvullende informatie

Hydroxychloroquinesulfaat wordt ook gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van malaria. Daarnaast wordt het toegepast bij andere reumatische aandoeningen, zoals Systemische Lupus Erythematoses.

Invloed op een zwangerschap en borstvoeding

Overleg altijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap overweegt.

Hydroxychloroquinesulfaat kan indien nodig, op voorschrift van uw behandelend arts, tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw arts, apotheker of reumaconsulent terecht.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Polikliniek Reumatologie: (013) 221 03 80

Locatie ETZ Elisabeth
Route 24

Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniekgebouw, wachtruimte 1

Locatie ETZ Waalwijk:
Route 29

Reumatologie, 43.065 01-19