

Radiofrequente behandeling van het ganglion sfenopalatinum

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Radiofrequente behandeling ganglion sfenopalatinum

Radiofrequente behandeling van het ganglion sfenopalatinum

In overleg met uw arts is besloten dat u de Radiofrequente behandeling (RF) van het ganglion sfenopalatinum krijgt. Deze behandeling met stroom dient als pijnbehandeling bij nek en rugpijn als normale pijnbestrijding met medicijnen onvoldoende pijnstilling geeft .

Vorbereidingen

Op de polikliniek is met u besproken of u een lichte vorm van algehele verdoving gaat krijgen (sedatie met propofol). In dit geval mag U een licht ontbijt om 07.00 uur. Hierna mag u niets meer eten of drinken.

De behandeling

U krijgt een afspraak mee met datum en tijdstip waarop u wordt verwacht op het Chirurgisch Dagcentrum, route 38. De behandeling zelf duurt 20 tot 30 minuten. U verblijft tussen de één en twee uur in het ziekenhuis. Bij de behandeling komt u op een behandeltafel te liggen. De te behandelen zijde wordt aangegeven met een stift.

Met behulp van röntgendoorlichting plaatst de anesthesioloog de naald via de wang in het zenuwknopje achter in de neus. De arts controleert vervolgens of de naald op de juiste plaats zit door enkele teststroompjes te geven. Dit voelt u in uw neus of gehemelte. De arts spuit vervolgens een verdovende vloeistof in. Hierna wordt de naald verwarmd door radiofrequente stroom (RF). Hierdoor wordt de zenuwknop voor langere tijd uitgeschakeld en kan geen pijn meer geleiden.

Allergieën

Als u allergisch bent voor contrastvloeistof of medicijnen moet u dit tijdig voor de ingreep melden.

Bloedverduunners

Als u bloedverduunners gebruikt, zoals Sintrom®, Marcoumar® of acenocoumarol, waarvoor u onder controle bent bij de Trombosedienst, moet u met de inname hiervan vóór de behandeling stoppen. Het aantal dagen dat u met de inname van de bloedverduunners moet

stoppen, hoort u van uw behandelend arts.

Bijwerkingen

Direct na de behandeling kunt u een doof gevoel hebben in het gehemelte aan de behandelde kant. Er is een kans dat er een bloeditstorting (blauwe plek) in de wang ontstaat. Ongeveer 3% van de patiënten krijgt een bloedneus doordat in de neus een bloedvaatje is geraakt. In een enkel geval moet de KNO-arts dit verhelpen.

Let op!

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelf deelnemen aan het verkeer. Laat u daarom ophalen. Na de behandeling kunt u enkele dagen napijn hebben. Hier kunt u zo nodig paracetamol voor gebruiken.

Resultaat

Pas na weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het uiteindelijke effect wordt dan ook na vier tot zes weken besproken door middel van een poliklinische afspraak of een telefonische controle waarbij de pijnspecialist u belt.

Telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Polikliniek Anesthesiologie: (013) 221 00 10

Chirurgisch Dagcentrum: (013) 221 80 40