

Ectropion

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Klachten	1
Oorzaken	1
Operatieve correctie	1
Bloedverdunnende middelen	2
Bijwerkingen en complicaties	2
Waarschuwing	2
Verwijderen van hechtingen en controle	2
Tot slot	2
Belangrijke telefoonnummers	3

U wordt verwacht in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) voor een poliklinische ingreep aan een ectropion. Een ectropion is een naar buiten gedraaide rand van het onderooglid. De ectropion veroorzaakt klachten en is cosmetisch storend omdat de rode binnenzijde van het ooglid zichtbaar is. Het slijmvlies onder het ooglid kan verdikt raken.

Klachten

Het onderooglid zorgt ervoor dat de tranen afgevoerd worden naar het traanafvoersysteem. Bij een ectropion functioneert het onderooglid niet goed meer, waardoor de tranen niet goed getransporteerd worden naar het afvoerkanaaltje van de traanwegen. Dit afvoerkanaaltje, ook wel traanpunt genoemd maakt zelf vaak ook geen contact meer met het oog. Dit leidt tot een tranend oog. Vaak is ook het oog geïrriteerd, omdat het ooglid minder goed sluit.

Oorzaken

Ectropion wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de weefsels van het ooglid, waardoor horizontale verslapping optreedt. Andere veel zeldzamere oorzaken kunnen zijn, littekenweefsel, huidziekten, verlammingen of een ooglidgezwell.

Operatieve correctie

Wanneer het ectropion het gevolg is van veroudering kan het verholpen worden door de horizontale slapte van het onderooglid te corrigeren. Horizontale slapte wordt gecorrigeerd door het onderooglid strakker te zetten. De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 30 minuten. Neem altijd iemand met u mee. Als u niet goed Nederlands spreekt neem dan iemand mee die dit wel kan. Dit om misverstanden te voorkomen.

Bloedverdunnende middelen

U moet uw medicijngebruik doorgeven aan uw oogarts. De oogarts bepaalt in overleg met uw behandelend arts of u wel of niet moet stoppen met het slikken van de bloedverdunnende middelen. Bij twijfel neemt u altijd contact op met polikliniek Oogheelkunde.

Bijwerkingen en complicaties

- Na de ingreep ontwikkelt zich soms een bloeditstorting en/of een zwelling. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan, is het verstandig bij thuiskomst direct enige tijd te koelen met bijvoorbeeld ijsblokjes in een theedoek of washandje.
- In zeer zeldzame gevallen kan er na de ingreep een bloeding ontstaan. Dit houdt in dat de wond behoorlijk blijft bloeden of dat de zwelling fors toeneemt. In dit geval moet u contact opnemen met het ziekenhuis. Gering bloedverlies, een bloeditstorting en zwelling zijn normaal voorkomende verschijnselen, waarvoor u geen contact hoeft op te nemen met het ziekenhuis.
- Tijdens de eerste week na de operatie kan er eventueel wat afscheiding uit het oog komen. Dit is ingedroogd wondvocht. Het is niet iets om u zorgen over te maken. Eventueel voorzichtig deppen met lauwwarm water is voldoende om de afscheiding te verwijderen.
- Het ooglid kan de eerste weken wat gevoelig blijven, dit wordt geleidelijk minder.
- Meestal treedt na een ectropion correctie een aanzienlijke verbetering op, soms bereikt men echter geen volledig normale situatie.
- Mocht u andere klachten krijgen, bel altijd voor overleg met de polikliniek. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur.

Ooglidoperaties zijn niet gevaarlijk. Zoals aan elke operatie is er toch een risico aan verbonden. Een blauw oog komt vaak voor, maar geneest snel. Lelijke littekens en infecties treden zeer zeldzaam op. De ernstigste complicatie van een ooglidoperatie is blindheid. Dit komt bij minder dan 1 op de 5000 operaties voor. De oorzaak is een bloeding na de operatie waarbij het bloed zich ophoopt in de oogkas. Daardoor raken de oogzenuw en het oog beklemd.

Waarschuwing

Wanneer u na een ooglidoperatie merkt dat het oog gaat uitpuilen, u minder gaat zien of de wond flink blijft bloeden, dan moet u direct contact op te nemen met uw oogarts of direct naar het ziekenhuis te gaan.

Verwijderen van hechtingen en controle

De hechtingen worden gemiddeld na 10 dagen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak.

Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00
Polikliniek Oogheelkunde: (013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Route 28

Locatie ETZ TweeSteden
Route 1B

Oogheelkunde, 43.1091 04-20

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

U wordt verwacht op omuur

Op locatie

Datum hechtingen verwijderen op.....om.....uur

A.u.b melden aan de balie.