

# De Radiofrequente (RF) behandeling bij cervicobrachialgie (Dagbehandeling)

## Inhoudsopgave

*Klik op het onderwerp om verder te lezen.*

<b>Vorbereidingen</b>	1
<b>De behandeling</b>	1
<b>Allergieën</b>	2
<b>Bloedverdunners</b>	2
<b>Bijwerkingen</b>	2
<b>Let op!</b>	2
<b>Resultaat</b>	2
<b>Tot slot</b>	2
<b>Belangrijke telefoonnummers</b>	2

In overleg met uw behandelend arts hebt u gekozen voor een Radiofrequente (RF) behandeling bij cervicobrachialgie. Deze behandeling is een pijnbehandeling met stroom, toegepast bij nekpijn, uitstralend in de arm (cervicobrachialgie). Er wordt voor deze behandeling gekozen als de normale pijnbestrijding met medicijnen onvoldoende is.

## Vorbereidingen

U kunt eventueel een lichte vorm van algehele verdoving krijgen (sedatie met propofol). Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U mag een licht ontbijt om 07.00 uur. Hierna mag u niets meer eten, drinken en roken.

## De behandeling

U krijgt een afspraak mee met de datum en het tijdstip waarop u wordt verwacht op het Chirurgisch Dagcentrum, route 38. Op de afdeling kunt u zich omkleden en krijgt u een O.K.-jasje. Vervolgens wordt u in een bed naar de voorbereidingsruimte gebracht en van daar gaat u naar de behandelkamer. Na de behandeling wordt u weer naar de afdeling gebracht, waar u kunt uitrusten. Hierna kunt u naar huis. De behandeling zelf duurt 20 tot 30 minuten. Op de dag van de behandeling verblijft u tussen de één en twee uur in het ziekenhuis.

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op een behandeltafel. De te behandelen zijde wordt aangegeven met een stift.

Met behulp van röntgendoorlichting plaatst de anesthesioloog een naald via de nek ter hoogte van het zenuwknopje van de te behandelen zenuw. De arts controleert vervolgens of de naald op de juiste plaats zit door enkele teststroompjes te geven. Dit voelt u in uw arm. De arts spuit vervolgens een verdovende vloeistof in. Hierna wordt de naald verwarmd door radiofrequente stroom (RF) waarmee vervolgens de zenuwknop voor langere tijd wordt uitgeschakeld en geen pijn meer kan geleiden.

## Allergieën

Als u allergisch bent voor contrastvloeistof of medicijnen moet u dit voor de ingreep melden.

## Bloedverduunners

Als u bloedverduunners gebruikt, zoals Sintrom<sup>®</sup>, Marcoumar<sup>®</sup> of acenocoumarol, waarvoor u onder controle bent bij de Trombosedienst, moet u met de inname hiervan vóór de behandeling stoppen. Het aantal dagen dat u met de inname van de bloedverduunners moet stoppen, hoort u van uw behandelend arts.

## Bijwerkingen

Direct na de behandeling kunt u een doof gevoel hebben in de arm aan de behandelde kant. Er is een kans dat er een bloedingstoring (blauwe plek) ontstaat op de plaats van de behandeling. De eerste uren kunt u tevens een zwaar aanvoelende arm hebben.

## Let op!

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Laat u daarom ophalen. Na de behandeling kunt u enkele dagen napijn hebben. Hier kunt u indien nodig paracetamol voor gebruiken.

## Resultaat

Pas na weken is het zinvol het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het uiteindelijke effect wordt dan ook na vier-zes weken besproken door middel van een poliklinische afspraak of een telefonische controle waarbij de pijnspecialist u belt.

## Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Anesthesiologie.

## Belangrijke telefoonnummers

**ETZ (Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis)** (013) 221 00 00  
**Polikliniek Anesthesiologie:** (013) 221 00 10

**Locatie ETZ Elisabeth**  
**Route 3**  
**Locatie ETZ TweeSteden**  
**Route 88**  
**Locatie ETZ Waalwijk**  
**Route 21**

**Chirurgisch Dagcentrum:** (013) 221 80 40  
**Route 38**

Anesthesiologie, 41.673 12-18

Copyright® ETZ  
Afdeling Communicatie  
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.