

De Radiofrequente (RF) behandeling bij cervicobrachialgie

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Radiofrequente behandeling bij cervicobrachialgie

De Radiofrequente (RF) behandeling bij cervicobrachialgie

In overleg met uw behandelend arts hebt u gekozen voor een Radiofrequente (RF) behandeling bij cervicobrachialgie. Deze behandeling is een pijnbehandeling met stroom, toegepast bij nekpijn, uitstralend in de arm (cervicobrachialgie). Er wordt voor deze behandeling gekozen als de normale pijnbestrijding met medicijnen onvoldoende is.

Vorbereidingen

U kunt eventueel een lichte vorm van algehele verdoving krijgen (sedatie met propofol). Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U mag een licht ontbijt om 07.00 uur. Hierna mag u niets meer eten, drinken en roken

De behandeling

U krijgt een afspraak mee met de datum en het tijdstip waarop u wordt verwacht op het Chirurgisch Dagcentrum, route 38. Op de afdeling kunt u zich omkleden en krijgt u een O.K.-jasje. Vervolgens wordt u in een bed naar de voorbereidingsruimte gebracht en van daar gaat u naar de behandelkamer.

Meer informatie over: De behandeling

U krijgt een afspraak mee met de datum en het tijdstip waarop u wordt verwacht op het Chirurgisch Dagcentrum, route 38. Op de afdeling kunt u zich omkleden en krijgt u een O.K.-jasje. Vervolgens wordt u in een bed naar de voorbereidingsruimte gebracht en van daar gaat u naar de behandelkamer.

Na de behandeling wordt u weer naar de afdeling gebracht, waar u kunt uitrusten. Hierna kunt u naar huis. De behandeling zelf duurt 20 tot 30 minuten. Op de dag van de behandeling verblijft u tussen de één en twee uur in het ziekenhuis. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op een behandeltafel. De te behandelen zijde wordt aangegeven met een stift. Met behulp van röntgendoorlichting plaatst de anesthesioloog een naald via de nek ter hoogte van het zenuwknoopje van de te behandelen zenuw. De arts controleert vervolgens of de naald op de juiste plaats zit door enkele teststroompjes te geven. Dit voelt u in uw arm. De arts spuit vervolgens een verdovende vloeistof in. Hierna wordt de naald verwarmd door radiofrequente stroom (RF) waarmee vervolgens de zenuwknoop voor langere tijd wordt uitgeschakeld en geen pijn meer kan geleiden.

Allergieën

Als u allergisch bent voor contrastvloeistof of medicijnen moet u dit voor de ingreep melden.

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt, zoals Sintrom®, Marcoumar® of acenocoumarol, waarvoor u onder controle bent bij de Trombosedienst, moet u met de inname hiervan vóór de behandeling stoppen. Het aantal dagen dat u met de inname van de bloedverdunners moet stoppen, hoort u van uw behandelend arts.

Bijwerkingen

Direct na de behandeling kunt u een doof gevoel hebben in de arm aan de behandelde kant. Er is een kans dat er een bloeding ontstaat (blauwe plek) op de plaats van de behandeling. De eerste uren kunt u tevens een zwaar aanvoelende arm hebben.

Let op!

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Laat u daarom ophalen. Na de behandeling kunt u enkele dagen napijn hebben. Hier kunt u indien nodig paracetamol voor gebruiken

Resultaat

Pas na weken is het zinvol het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het uiteindelijke effect wordt dan ook na vier-zes weken besproken door middel van een poliklinische afspraak of een telefonische controle waarbij de pijnspecialist u belt.

Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Anesthesiologie

Telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis) (013) 221 00 00

Polikliniek Anesthesiologie: (013) 221 00 10

Chirurgisch Dagcentrum: (013) 221 80 40