

Azathioprine

Imuran®

Reumatologie

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Werking	1
Gebruik	1
Mogelijke bijverschijnselen	1
Aanvullende informatie	2
Invloed op de voortplanting en borstvoeding	2
Belangrijke telefoonnummers	2

In overleg met u heeft uw behandelend arts u het geneesmiddel azathioprine voorgeschreven. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw arts, verpleegkundig specialist, apotheker of verpleegkundig reumaconsulent terecht.

Werking

Azathioprine is een antireumaticum. Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor zwelling en pijn van de gewrichten en bovendien ochtendstijfheid. Het heeft een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsbeschadigingen.

Azathioprine werkt langzaam. Het kan twaalf weken of langer duren voor het effect merkbaar wordt.

Uw arts zal u dan ook meestal adviseren, naast azathioprine tijdelijk andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

Gebruik

Azathioprine wordt toegediend in tabletten van 25 of 50 mg. Het wordt in één of meerdere doseringen per dag ingenomen. De voorgeschreven hoeveelheid wordt gebaseerd op uw lichaamsgewicht.

U moet de tabletten geheel doorslikken, bijvoorbeeld tijdens de maaltijd of met water.

Mogelijke bijverschijnselen

- Misselijkheid, braken, verminderde eetlust, diarree;
- huiduitslag;
- een verhoogde kans op infecties;
- het spontaan verschijnen van blauwe plekken;
- leverfunctiestoornissen.

Door regelmatig het bloed te onderzoeken, kunnen vroegtijdig tekenen van lever- of beenmergbeschadiging worden opgespoord. U moet zich daarom goed aan de afspraak voor bloedcontrole houden.

Als één of meerdere van deze verschijnselen bij u optreden, moet u contact opnemen met uw behandelend arts of huisarts

Aanvullende informatie

Als u naast azathioprine, urinezuurverlagende middelen gebruikt (allopurinol, bij jicht), moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen. De dosis azathioprine wordt dan aangepast.

Invloed op de voortplanting en borstvoeding

Overleg altijd met uw arts als u een zwangerschap overweegt. De medicatie kan dan eventueel worden aangepast of vervangen.

NB: Dit geldt ook voor mannen.

U mag geen borstvoeding geven tijdens behandeling met azathioprine.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

**Locatie ETZ Elisabeth
Polikliniek Reumatologie:** (013) 539 80 30

**Locatie ETZ TweeSteden
Polikliniek Reumatologie:** (013) 465 54 30

**Locatie ETZ Waalwijk:
Polikliniek Reumatologie:** (0416) 68 22 05

Reumatologie,4 2.062 05-17

