

Emla[®] zalf

Instructies voor het gebruik

Emla[®] zalf is een zalf die ervoor zorgt dat de huid waar aangeprikt wordt, verdoofd is.

Instructie voor het gebruik

- U moet de Emla[®] zalf één uur voordat u aangeprikt gaat worden aanbrengen (bijvoorbeeld voor u in de taxi stapt).
- De bedoeling is dat u op de shunt, op de door de verpleegkundige afgesproken plaatsen, de Emla[®] zalf aanbrengt.
- Gebruik een flinke hoeveelheid (dot), dit is twee centimeter zalf per prikplaats.
- U moet de zalf aanbrengen en niet inwrijven.
- Dek daarna de hoeveelheid zalf af met een speciale Tegaderm[®] pleister of huishoudfolie. Deze zorgt ervoor dat de zalf op zijn plaats blijft zitten.
- Probeer alleen de shunt te bedekken en zo min mogelijk de huid naast de shunt.

Complicaties

Het kan gebeuren dat uw huid geïrriteerd raakt door de Emla[®] zalf, de Tegaderm[®] pleister of door een combinatie hiervan. Laat dit altijd aan de verpleegkundige weten. Er wordt dan uitgezocht waar de irritatie precies vandaan komt. Als de irritatie toeneemt, kan het zijn dat het gebruik van de Emla[®] zalf gestaakt moet worden. Er kan dan de verdovende spray Xylocaine[®] gebruikt worden. Een enkele keer kunnen er toch nog pijnklachten zijn, ondanks het gebruik van Emla[®] zalf of Xylocaine[®] spray.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze instructie nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Dialyse.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Locatie ETZ Elisabeth
Afdeling Dialyse: (013) 221 29 10
Route 10

Locatie ETZ Waalwijk (013) 221 1291
Eerste etage Gezondheidscentrum
Het Koetshuis

Dialyse 1.355 01-19

Copyright[®] ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

