

Behandeling van ijzertekort door middel van een infuus met Ferinject®

Locatie ETZ Elisabeth

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Vorbereiding op de behandeling	1
Ijzertekort	1
Behandeling met Ferinject®	1
Na de behandeling	2
Bijwerkingen	2
Vragen	2
Belangrijke telefoonnummers	2

Uw behandelaar heeft een infuus met Ferinject® voorgeschreven. In deze folder leest u meer over dit medicijn.

Vorbereiding op de behandeling

Voor de behandeling met het medicijn Ferinject® hoeft u geen bepaalde voorbereidingen te treffen.

Ijzertekort

Uw lichaam heeft ijzer nodig. Ijzer zorgt voor een goede conditie, bevordert de concentratie en het houdt uw huid, haar en nagels gezond. Ook versterkt het de afweer tegen ziektes. De rode bloedlichaampjes in het bloed gebruiken ijzer om zuurstof op te nemen. Zij vervoeren het door het hele lichaam. Uw lichaam maakt zelf geen ijzer aan, daarom moet u dagelijks voldoende ijzer met het voedsel binnen krijgen. Onder bepaalde omstandigheden krijgt u onvoldoende ijzer binnen via het voedsel. Of uw lichaam neemt onvoldoende ijzer op. Het lichaam gebruikt dan het ijzer dat in de lever en milt is opgeslagen. Als die voorraad op is, ontstaat er ijzertekort.

Behandeling met Ferinject®

Ferinject® is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van bloedarmoede. Het doel van de behandeling is het aanvullen van ijzervoorraden in het lichaam en voor het behandelen van bloedarmoede. Ferinject® krijgt u via een infuus, maximal 1000 mg per week. Het heeft een bruine kleur.

De behandeling vindt plaats op locatie ETZ Elisabeth, op etage C, kamer 1 t/m 16 (C1).

De behandeling zelf duurt 30 tot 60 minuten. Voor de behandeling wordt een infuus in de arm geprikt.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u op eigen gelegenheid naar huis. Het is toegestaan om na de behandeling met het medicijn Ferinject® auto te rijden. U merkt na ongeveer 8 dagen het resultaat van de behandeling. De klachten die u door het ijzertekort had zullen verminderen en/of verdwijnen.

Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Ferinject® bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Mogelijke bijwerkingen:

- De volgende symptomen worden vaak waargenomen:
hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn, verstopping, diarree, uitslag, reacties op de aanprikplaats.
- Soms kunt u last hebben van de volgende bijwerkingen:
jeuk of tintelingen, lage bloeddruk, roodheid, smaakstoornissen, spierpijn, rugpijn, gewrichtspijn, koorts, vermoeidheid, pijn in de borstkast, stijfheid, ongemak, vochtophoping,
- Zelden kan kortademigheid als bijwerking ontstaan.

Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die hier niet is vermeld, raadpleeg dan uw behandelaar.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze stellen op de dagbehandeling Maag-, Darm- en leverziekten (MDL), of aan uw behandelaar. Bent u opgenomen in het ziekenhuis dan is de uw behandelende arts of assistent MDL uw aanspreekpunt.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

**Locatie ETZ Elisabeth
Polikliniek MDL:** (013) 221 02 00
Route 24 en route 30

Dagbehandeling MDL: (013) 221 23 11
Etage C, kamer 1 t/m 16

Maag-, darm-, leverziekten, 43.1123 01-19