

Correctie van afstaande oren

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Ziekte of verhindering	1
Medicijnen	2
Vervoer naar huis	2
Wat u verder nog moet weten	2
Wat gebeurt er voor de ingreep?	2
De dag van de ingreep	2
Wat gebeurt er tijdens de ingreep?	3
Wat gebeurt er na de ingreep?	3
Complicaties	4
Tot slot	4
Belangrijke telefoonnummers	4

Deze brochure is bestemd voor de ouders van kinderen die geopereerd worden aan afstaande oren (flaporen). Afstaande oren zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Het corrigeren van afstaande oren kan al gedaan worden als kinderen 3 à 4 jaar oud zijn. Voor die tijd is het oor namelijk nog niet volgroeid. Als de oren dan geopereerd worden, kan de vorm nog flink veranderen.

Voor de operatie zijn er waarschijnlijk al een paar stappen genomen:

- de huisarts heeft u verwezen naar de polikliniek Plastische Chirurgie;
- in overleg met de plastisch chirurg is besloten dat uw kind binnenkort naar het ziekenhuis komt voor een zogenaamde 'oorschelpcorrectie'. Bij deze ingreep zet de chirurg de oren dicht (platter) tegen het hoofd;
- de plastisch chirurg heeft de ingreep aangevraagd bij uw ziektekosten verzekering. De verzekeringen vergoeden de ingreep vrijwel altijd volledig bij kinderen tot en met 12 jaar.

De correctie van afstaande oren gebeurt afhankelijk van de vorm van verdoving op het Behandelcentrum of op de operatiekamers.

In deze brochure kunt u lezen wat er voor, tijdens en na de ingreep gebeurt. Zo kunt u bijvoorbeeld lezen hoe lang uw kind pijn heeft, hoe lang het verband om het hoofd blijft zitten, wanneer u contact op moet nemen met de polikliniek en wanneer de controles plaatsvinden. Ook vindt u informatie over wat uw kind wel en niet mag doen. Goede voorlichting is belangrijk, want hoe meer u weet over de ingreep, hoe beter u het herstel van uw kind kunt ondersteunen.

Ziekte of verhindering

Als uw kind door ziekte of koorts boven de 38°C verhinderd is, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.

Medicijnen

Als uw kind dagelijks medicijnen moet innemen, brengt u deze dan op de dag van de opname mee naar het ziekenhuis. De behandelend specialist beslist dan of ze wel of niet ingenomen moeten worden.

Vervoer naar huis

Bij de voorbereidingen hoort ook het regelen van het vervoer naar huis na de ingreep. U wordt aangeraden niet alleen met uw kind in de auto naar huis te gaan. Sommige kinderen worden onderweg misselijk en kunnen gaan braken. Zorg dat u een handdoek, bakje of plastic zak bij de hand heeft.

Wat u verder nog moet weten

De correctie van afstaande oren heeft een blijvend karakter; het kan dus niet meer veranderd worden. Er komt een litteken achter het oor. Het is belangrijk dat u een reële verwachting hebt van deze ingreep. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van de oren verwachten maar geen perfectie. Het is vrijwel onmogelijk om na deze correctie absolute symmetrie (gelijkheid) van de oren te krijgen.

Wat gebeurt er voor de ingreep?

De voorbereiding

Meestal weet al u enige tijd van tevoren dat uw kind een dag opgenomen wordt. Daardoor hebt u voldoende tijd uw kind voor te bereiden op het laten corrigeren van afstaande oren. Wat u uw zoon of dochter vertelt, is helemaal afhankelijk van het type kind en de leeftijd. Als ouder of verzorger kunt u dat zelf het beste aanvoelen. Bij kleine kinderen is het raadzaam alles een aantal keer te herhalen.

Goede hulpmiddelen bij de voorbereiding zijn boekjes over kind en ziekenhuis. Bijvoorbeeld:

- Bij de dokter, van H. Oxenburg;
- Tonnie gaat naar de dokter, van G. Wolde.

Deze boekjes zijn verkrijgbaar in de boekhandel en bibliotheek.

De dag van de ingreep

Op de dag van de ingreep meldt u zich, afhankelijk van de vorm van verdoving, met uw kind op het Behandelcentrum. Het Behandelcentrum vindt u op route 60 op de begane grond. Deze afdeling is gecombineerd met polikliniek Chirurgie. U meldt zich met uw patiëntenpas aan bij de aanmeldzuil bij binnenkomst in het ziekenhuis en neemt daarna plaats in de wachtruimte.

Fam bevindt zich op de eerste verdieping van het ETZ, locatie Elisabeth (route 80). U loopt voorbij het bezoekersrestaurant naar het eerste liftenblok aan de rechterkant. U gaat met de lift naar de eerste verdieping. Als u de lift uitstapt, gaat u rechtsaf.

Als de ingreep plaatsvindt onder algehele verdoving, moet uw kind nuchter zijn voor de ingreep.

Nuchter zijn voor de operatie

Voor de operatie moet u vanaf een bepaalde tijd nuchter zijn. De richtlijnen hiervoor vindt u in de folder *Als u een ingreep onder anesthesie moet ondergaan*. Deze krijgt u tijdens de pre-operatieve screening.

Wat gebeurt er tijdens de ingreep?

Als de plaatselijke of algehele verdoving werkt, maakt de plastisch chirurg de huid achter het oor van uw kind los. Vervolgens zet hij/zij het oor dicht tegen het hoofd. Dit doet hij/zij door het kraakbeen van het oor te plooiën. In bijna alle gevallen is de oorzaak van flaporen namelijk dat er een plooi ontbreekt in het kraakbeen van het oor. Als de plastisch chirurg de plooi heeft aangebracht, sluit hij/zij de wond met oplosbare hechtingen. Daarna wordt het andere oor geopereerd. Als beide oren zijn gecorrigeerd, wordt er een dik drukverband aangelegd, in de vorm van een soort tulband. Deze tulband zorgt ervoor dat de oren plat tegen het hoofd blijven liggen en dat de huid van het oor weer goed rond het kraakbeen groeit. De hele ingreep duurt ongeveer een uur.

Wat gebeurt er na de ingreep?

Als uw kind een plaatselijke verdoving heeft gehad, mag hij/zij meteen na de ingreep weer mee naar huis. Is uw kind onder algehele narcose geweest, duurt het wat langer voordat uw kind naar huis mag. In dat geval gaat uw kind eerst naar de (kinder)uitslaapkamer en vervolgens terug naar Fam. Als alles goed gaat mag uw kind enkele uren later mee naar huis.

De eerste week

De eerste twee dagen zal uw kind veel pijn hebben. Om de pijn weg te nemen, geeft u uw kind de voorgeschreven pijnmedicatie die vermeld staat op het informatieblad. Deze krijgt u mee als u naar huis gaat.

Het is mogelijk dat er een paar druppeltjes bloed van onder het verband komen. Dit is normaal en u hoeft zich hier dan ook geen zorgen over te maken.

Uw kind mag eten of drinken wat het maar wil. Ook mag het (rustig) spelen. Als uw kind zich goed voelt, mag het naar school. Meedoen met de gymles mag pas na 6 weken.

Let op: de tulband om het hoofd van uw kind mag niet nat worden.

Heel soms raken de oren van een kind ontstoken. U kunt dit merken doordat de pijn na twee dagen niet minder wordt maar juist erger en doordat uw kind koorts boven de 38°C krijgt. In dat geval wordt u dringend aangeraden contact op te nemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp of de kinderafdeling.

Na de eerste week

Het drukverband blijft afhankelijk van de behandelend arts 3 tot 7 dagen zitten. Na deze 3-7 dagen gaat u met uw kind weer terug naar de polikliniek, waar het verband wordt verwijderd. De oren van uw kind zullen dan nog dik en blauw zijn. Dit kan ongeveer drie maanden duren. Als uw kind door dr. Hartman geopereerd wordt dan krijgt uw kind meteen na de operatie de zweetband of haarband om. Erg belangrijk is dan ook dat u deze meeneemt op de dag van de operatie.

Uw kind moet tot 6 weken na de operatie een zweetband of haarband over de oren dragen. Na 3 weken hoeft dit alleen nog 's nachts. Dit is belangrijk omdat met deze band voorkomen wordt dat de oren tijdens het slapen dubbelklappen.

Nu het verband eraf is, mag uw kind wel gewoon onder de douche of in bad. U mag de oren daarbij ook voorzichtig schoonmaken. Doe dit altijd van voor naar achter. Let erop dat u bij het uittrekken van kleding deze van voor naar achter over het hoofd trekt.

Na zes weken

Na zes weken mag uw kind weer meedoen met de gymles. Ruwe sport, bal- en contactsporten, zoals judo, mag uw kind nu weer beoefenen. Er volgt indien nodig een tweede controle op de polikliniek.

Na drie maanden

Na drie maanden zijn de oren genezen. De oren zullen echter nog wel een hele poos gevoelig blijven, vooral voor kou. Deze gevoeligheid voor kou duurt ongeveer een jaar.

Complicaties

Aangezien kraakbeen een weerbarstig soort weefsel is, bestaat de kans dat de oren na de correctie terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm. Een blijvend resultaat kan daarom niet gegarandeerd worden. Dit geldt ook voor symmetrie (gelijkheid) van de oren na de correctie. Een enkele keer zal het noodzakelijk zijn om nog een correctie uit te voeren.

Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt over de ingreep, kunt u die stellen aan de plastisch chirurg. Meer informatie over een behandeling of operatie bij kinderen kunt u lezen in de gelijknamige folder die u kunt opvragen bij de polikliniek Plastische Chirurgie.

Meer informatie over het inzien van uw eigen medische dossier kunt u vinden op: www.etz.nl/mijnnetz

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00
Polikliniek Plastische Chirurgie: (013) 221 03 40

Locatie ETZ Elisabeth
Route 32

Locatie ETZ Waalwijk
Route 46

E-mail: plc@etz.nl

Fam: (013) 221 00 80

Plastische Chirurgie, 41.241 07-19

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.