

Trazodon

Trazolan

Psychofarmaca

Versie 6

Datum 7-1-2022

**Afnamemateriaal**

Serum

**Buistype + volume + kleur**

Stolbuis met rode dop

1 volle buis (6 mL)

-

-

Rood



-

**Afnamecondities**

Dalspiegel afnemen vlak voor de gift.

**Bepalingsfrequentie**

Deze bepaling wordt opgestuurd. De uitslag volgt gewoonlijk binnen 14 dagen.

Referentiewaarden

Voor meer informatie zie: UMCG bepalingenwijzer

<https://www.umcg.nl/UMCG/Afd>
Normaal

Therapeutisch: 0,7-1 mg/L

Toxisch

Toxisch: >4,0 mg/L

Klinische betekenis

Halfwaardetijd: 4-13 uur.

Actieve metaboliet: chloorfenylpiperazine.

-

Overige opmerkingen

-

Trazodon

Trazolan

Psychofarmaca

Versie 6

Datum 7-1-2022

Uitvoerende instelling

Laboratorium

Universitair Medisch Centrum Groningen
(via Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ)

Analisten KFL

LIMS-code

TRAZT

Bepalingsmethode

LC-MS/MS

Verzendconditie

Kamertemperatuur (15-25 °C)

Bewaarconditie

Koelkast (2-8 °C)

Opmerkingen

-

Contactpersoon

Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696.

Referenties

1. Bepalingenwijzer UMCG. Geraadpleegd: 08-12-2020.

ISO-15189 scope

ISO 15189:2012 (M170)

Scope

KF.TDM.02

NZA code

072809

Wijzigingen

20220107 VvW: Tekstuele aanpassingen.

20201215 KL: Materiaal gewijzigd van EDTA-plasma (paars) naar stobloed-serum (rood). Foto buis gewijzigd. Therapeutische waarden van dal/top naar 0,7- 1 mg/L.

Bewaarconditie van diepvries naar koelkast. Uitvoerende instelling van UMCU naar UMCG. Methode is van HPLC naar LC-MS/MS

20191004 ML: LIMS-code van TRAZ naar TRAZT. Telnr dienstdoende ziekenhuisapotheker gewijzigd.

20170710 ML: LIMS-code toegevoegd. Tekstueel locatie TweeSteden en Elisabeth aangepast. Transport- en bewaarconditie volledig genoteerd. Externe kwaliteitscontrole toegevoegd.