

Atropine[®] penalisatie

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Werking van de druppels	1
Eerstvolgende controle	1
Belangrijk	2
Heeft u nog vragen?	2
Belangrijke telefoonnummers	2

In overleg met uw orthoptist is er gekozen voor een behandeling met Atropine[®] oogdruppels. In specifieke gevallen kan dit een alternatief zijn voor het afplakken met oogpleisters bij een behandeling van een lui oog (amblyopie). Het oog met de hoogste gezichtsscherpte krijgt de Atropine[®] oogdruppel. Hierdoor gaat dit oog wazig zien en neemt het luie oog de fixatie over. Het oog wordt zo gestimuleerd om te kijken en gaat beter zien. Het effect is het meest maximaal bij dichtbij kijken.

Werking van de druppels

Als de druppels goed ingewerkt zijn, is de pupil groot. Uw kind kan hierdoor last hebben van licht en wazig zien. Een zonnebril en/of petje kan een oplossing zijn.

Als de orthoptist aangeeft dat u met de Atropine[®] oogdruppels mag stoppen verdwijnt de wijde pupil en dus de overgevoeligheid voor licht langzaam evenals het wazig zien. Dit kan echter nog twee weken aanhouden.

Het druppelen gaat als volgt:

- voor het druppelen handen wassen;
- zet het druppelflesje klaar, samen met wat gaasjes/tissues;
- leg uw kind op de rug;
- neem het druppelflesje in de ene hand;
- houd met duim en wijsvinger van de andere hand de oogleden van het desbetreffende oog open;
- laat 1 druppel in het geopende oog vallen;
- laat de oogleden los en veeg met het gaasje het gesloten oog af;
- was na het druppelen uw handen.

Na opening van het flesje zijn de oogdruppels een maand houdbaar. Van uw orthoptist heeft u een herhalingsrecept gekregen.

Eerstvolgende controle

Het is belangrijk om door te gaan met het druppelschema dat de orthoptist met u afgesproken heeft, ook als uw kind een controle afspraak heeft. Zo kan de orthoptist bepalen of de Atropine[®] druppel effect heeft gehad en of er verder gegaan moet worden met deze manier van behandelen.



Belangrijk

- Het flesje Atropine® oogdruppels altijd buiten het bereik van kinderen houden. De druppels zijn bij inname via de mond ZEER giftig! Mocht dit toch gebeuren, neem dan direct contact op met de huisarts.
- Als uw kind een hartafwijking heeft, druppel dan niet en neem contact op met de polikliniek Oogheelkunde.
- Overgevoeligheid voor de druppels treedt zelden op. Als uw kind onverhoopt toch overgevoelig is voor de druppels, dan kunnen de volgende reacties optreden: koorts, sufheid, braken, rode uitslag in het gezicht of op de armen, diarree en een droge mond (veel willen drinken). Als één van deze symptomen optreedt, stop dan met druppelen en neem contact op met uw huisarts.
- Daarnaast wordt u verzocht om de polikliniek Oogheelkunde in te lichten dat uw kind vanwege overgevoeligheid niet de druppel heeft gekregen.
- Als het flesje leeg is of als u mag stoppen met de behandeling kunt u het flesje het beste terugbrengen naar de apotheek, zodat het veilig vernietigd kan worden.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 22 100 00
Polikliniek Oogheelkunde: (013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Route 28

Locatie ETZ TweeSteden
Route 1B

Locatie ETZ Waalwijk
Route 43

.....keer per week in het.....oog
.....dag ochtend / middag / avond
.....dag ochtend / middag / avond
.....dag ochtend / middag / avond

Oogheelkunde, 43.1114 04-20

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.