

Behandeling van een MRSA-besmetting voorafgaand aan uw ziekenhuisopname

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Gevolgen van een MRSA-besmetting	1
MRSA en ziekenhuisopname	1
Behandeling van de MRSA-infectie	1
Na de behandeling	2
Na uw ziekenhuisopname	3
Belangrijke data	3
Tot slot	3
Belangrijke telefoonnummers	3

Uit onderzoek is gebleken dat u de MRSA-bacterie bij zich draagt. Binnenkort wordt u opgenomen in het ziekenhuis. De MRSA-bacterie kan voor u een risico vormen als u een behandeling moet ondergaan. Daarom wordt u voorafgaand aan uw opname in het ziekenhuis behandeld voor de MRSA-besmetting.

In deze folder vindt u informatie over de behandeling van de MRSA-bacterie. Voor algemene informatie over MRSA verwijzen wij u naar de folder *'MRSA, achtergrond en informatie'*.

Gevolgen van een MRSA-besmetting

Als u besmet bent, merkt u daar waarschijnlijk zelf niets van. U wordt waarschijnlijk ook niet ziek. MRSA geeft meestal geen ziekteverschijnselen bij gezonde mensen die deze bacterie bij zich dragen. Maar bij mensen met een sterk verminderde weerstand of met wonden, kan een MRSA-infectie ontstaan die kan leiden tot ernstige complicaties.

MRSA en ziekenhuisopname

Afhankelijk van de aandoening en het ziekteverloop, kiest een arts er soms voor om de MRSA-bacterie te behandelen voordat een patiënt wordt opgenomen.

Deze behandeling duurt gemiddeld zeven dagen en bestaat uit het wassen met een desinfecterende zeep en het aanbrengen van zalf in de neus. Mogelijk wordt dat aangevuld met een antibioticakuur. Uw behandelend arts bespreekt met u of hij u van tevoren gaat behandelen. De behandeling wordt ingezet voordat u wordt opgenomen in het ziekenhuis.

De afdeling Infectiepreventie wordt op de hoogte gebracht van uw behandeling. Een medewerker van de afdeling is gedurende het traject uw contactpersoon. Hij/zij houdt ook contact met uw behandelend arts en stellen hem/haar op de hoogte van de uitslagen van kweken en behandeling.

Behandeling van de MRSA-infectie

Een MRSA-besmetting kan behandeld worden. Om de behandeling te kunnen starten, is het belangrijk

om te weten of u neusdrager (ongecompliceerd) of keel/rectaal drager (gecompliceerd) bent.

Bent u neusdrager, dan krijgt u via uw behandelend arts een recept waarmee u de middelen, Bactroban® en Betadine®, kunt halen. U kunt met dit recept terecht bij uw eigen apotheek.

Bent u keel/rectaal drager, dan wordt u doorverwezen naar de infectioloog. Hij schrijft u een behandeling met antibiotica voor. De afdeling Infectiepreventie maakt deze afspraak voor u.

Behandeling ongecompliceerd dragerschap

De behandeling bestaat uit:

- Muporicine® neuszalf (Bactroban®) driemaal daags in beide neusgaten aanbrengen, gedurende 7 dagen voorafgaand aan uw opname in het ziekenhuis.
- Wassen van het lichaam en haar met Betadine® shampoo (75 mg/ml), dagelijks gedurende 7 dagen voorafgaand aan uw opname in het ziekenhuis. Het gehele lichaam en de haren wassen. Daarnaast mogen gewone verzorgingsproducten worden gebruikt.
- Desinfecteer kammen en borstels en dergelijke voorafgaand aan de behandeling met Betadine® shampoo en gebruik een nieuwe tandenborstel.
- Gebruik dagelijks schoon ondergoed, schone kleding, schone washandjes en handdoeken.
- Bij de start, op dag 2 en dag 5 van de behandeling het beddengoed volledig verschoonen. Was het linnengoed zo warm als toegestaan. Bij het naar bed gaan moet ook gedurende de behandeling schoon ondergoed en nachtkleding worden aangetrokken.

Behandeling gecompliceerd dragerschap

De behandeling bestaat uit:

- voorgeschreven antibiotica door infectioloog;
- alle middelen en maatregelen beschreven onder ongecompliceerd dragerschap.

Woont of werkt u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens, dan wordt u verzocht om tijdens de behandeling niet in de stallen te komen, omdat er dan een risico op opnieuw besmetting is.

Soms is het nodig om bij uw partner en gezinsleden MRSA-kweken af te nemen. Als zij besmet zijn, dan volgen zij de behandeling voor ongecompliceerd dragerschap. Alle MRSA positieve factoren in uw omgeving hebben invloed op de kans van slagen van uw behandeling.

Na de behandeling

1. U wordt opgenomen.

Er worden, na de behandeling, op de dag voor de operatie kweken bij u afgenomen voor een sneltest en een kweek.

De uitslag van de sneltest is na 3 tot 4 uur bekend en wordt aan u en uw behandelend arts doorgegeven.

Afhankelijk van de uitslag van de sneltest wordt u wel of niet in isolatie opgenomen. In een enkel geval beslist de behandelend arts de operatie uit te stellen als de behandeling niet heeft geholpen (en u dus nog MRSA-positief bent gebleven). Dit hangt af van de zwaarte en het risico van de operatie. Dit bespreekt uw behandelaar met u.

Soms kan het wenselijk zijn om te controleren of de MRSA-besmetting weg blijft. Of dit voor u van

toepassing is en hoe dit schema met controle kweekmomenten er dan uit komt te zien, bespreekt de deskundige Infectiepreventie met u.

2. U wordt niet opgenomen.

Na uw behandeling wordt bekeken of de behandeling succesvol is geweest. Als dat zo is, worden de MRSA-kweken herhaald volgens een schema met controle kweekmomenten dat u via de afdeling Infectiepreventie krijgt.

Na de behandeling wordt een aantal kweken afgenomen om te kijken of de MRSA-bacterie is verdwenen.

Na uw ziekenhuisopname

Loopt u geen MRSA-risico in het dagelijks leven en bent u succesvol behandeld voor de MRSA (inclusief controlekweken), dan wordt de MRSA-aantekening uit uw dossier verwijderd.

Voor een patiënt die in het dagelijks leven woont of werkt op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens, gelden andere regels. Omdat deze personen elke dag risico lopen, is de laatste kweek, waarin de MRSA niet aantoonbaar is, drie maanden geldig. Deze patiënten blijven in de categorie vallen waarbij een verhoogd risico is op dragerschap van de MRSA.

Belangrijke data

Start behandeling
Kweek voor sneltest
Operatie

Tot slot

We beseffen dat deze situatie voor u ingrijpend en onaangenaam is. Voor meer informatie kunt u terecht bij de adviseurs infectiepreventie.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Afdeling Infectiepreventie: (013) 221 26 66
infectiepreventie@etz.nl

