

Ciclosporine (Neoral[®]) bij colitis ulcerosa

Maag-, Darm-, Leverziekten

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Algemeen	1
Werking	1
Gebruiksaanwijzing	1
Bijwerkingen	2
Belangrijk	2
Aanvullende informatie	3
Tot slot	3
Belangrijke telefoonnummers	3

Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van ciclosporine. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee bij uw behandelend arts terecht.

Algemeen

Tot nu toe is de oorzaak van colitis ulcerosa onbekend. Elke behandeling met medicijnen bij deze ziekte is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte kunnen voordoen. De ziekte geneest niet definitief door de behandeling met medicijnen. Na het afbouwen van of stoppen met deze medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Werking

Uw behandelend arts schrijft meestal ciclosporine voor wanneer andere medicijnen niet of onvoldoende hebben geholpen. Ciclosporine hoort tot de groep van immunosuppressiva. Dit zijn geneesmiddelen die de natuurlijke lichaamsafweer onderdrukken. Op deze wijze wordt de ontsteking in de darm afgeremd. Ciclosporine kan in combinatie met andere medicijnen worden voorgeschreven.

Gebruiksaanwijzing

In het begin van de behandeling wordt ciclosporine via een infuus toegediend. De juiste hoeveelheid ciclosporine wordt door de arts voor iedere patiënt individueel bepaald.

Als het ciclosporine-infuus goed aanslaat, wordt na een aantal dagen overgegaan op ciclosporine in tabletvorm (Neoral[®]). Deze worden gedurende 3-6 maanden gecontinueerd. Over de verdere behandeling volgt overleg met uw behandelend arts.

De voorgeschreven hoeveelheid is berekend op uw lichaamsgewicht en wordt verdeeld in twee doseringen per dag. Een deel neemt u 's ochtends in en het andere deel 's avonds, voor de maaltijd. De capsules hebben een karakteristieke geur. Zij moeten in zijn geheel doorgeslikt worden. U mag er

dus niet op kauwen of ze fijn maken.

Bloedonderzoek is een hulpmiddel voor het bepalen van de juiste dosering; net voor dit bloedonderzoek mag u **geen** Neoral[®] gebruiken (dalspiegel). Deze dosis kan na het bloedprikken, dus wat later, ingenomen worden.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan een geneesmiddel ook enige bijwerkingen (ongewenste reacties) veroorzaken. Bijwerkingen treden niet bij iedereen op. Als deze wel optreden, moet u uw arts of verpleegkundige waarschuwen.

Binnen *1 tot 2 weken* na de toediening van Ciclosporine kunt u last krijgen van:

- Allergische reactie bij toediening als infuus.
- Branderig gevoel in de handen en voeten.
- Moeheid.
- Hoofdpijn.
- Tremor (trillen).
- Huiduitslag.
- Verminderde eetlust.
- Misselijkheid en soms braken.

Gebruikt u voor *langere tijd* ciclosporine dan hebt u een kleine kans op de volgende bijwerkingen:

- Toename van de lichaamsbehaarung.
- Gewichtstoename.
- Zwelling van gezicht en/of borsten.
- Pijnlijke of uitblijvende menstruatie.
- Gezwollen of ontstoken tandvlees.

Bijwerkingen die de arts kan doen besluiten om de dosering te verlagen of te staken:

- Verhoogde bloeddruk en snelle hartslag.
- Nierfunctiestoornissen.
- Epileptische aanvallen.
- Infecties.
- Leverfunctiestoornissen.

Belangrijk

- Om vroegtijdige signalen van lever- of nierbeschadiging op te sporen, controleert uw arts regelmatig uw bloed en uw bloeddruk.
- *Houd u daarom goed aan de afspraken.*
- Let zelf op: keelpijn, verkoudheid, vies sputum, pijn bij plassen en koorts.
- *Waarschuw uw behandelend arts* bij boven genoemde verschijnselen of bij andere lichamelijke veranderingen tijdens de behandeling. Is uw behandelend arts door omstandigheden moeilijk bereikbaar, waarschuw dan uw huisarts.
- Bij ernstige bijwerkingen moet u, na overleg met de arts, tijdelijk stoppen met ciclosporine.
- Extra goede mondverzorging is van groot belang.

Aanvullende informatie

Effect op de voortplanting

Er zijn onvoldoende gegevens over de effecten van ciclosporine bij zwangerschap. Het middel passeert de placenta en gaat over in de moedermelk. Gebruik van ciclosporine tijdens zwangerschap of borstvoeding wordt ontraden.

Gebruik andere medicijnen

Bepaalde medicijnen kunnen, bij gelijktijdig gebruik, de werking van ciclosporine en/of sommige bijwerkingen van het middel beïnvloeden. (bijvoorbeeld ketoconazol, fluconazol, itraconazol; erythromycine, doxycycline, rifampicine; metoclopramide; allopurinol; amiodaron; diltiazem, nicardipine; galzuurderivaten; fenytoïne; Sint-janskruid). Meld daarom altijd bij uw huisarts of specialist dat u met ciclosporine behandeld wordt.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt of meer informatie wilt, kunt u met uw vragen terecht bij de verpleegkundigen op uw afdeling en uw behandelend arts. Zijn uw problemen of vragen niet dringend, overleg deze dan met uw behandelend arts of de nurse practitioner tijdens uw controlebezoek aan de polikliniek.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

**Locatie ETZ Elisabeth
Polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten:
Route 24 en 30** (013) 221 02 00

Maag-, Darm-, Leverziekten 42.371 01-19

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.