

Blokkade van de plexus coeliacus

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Blokkade van de plexus coeliacus

Blokkade van de plexus coeliacus

In overleg met uw behandelend arts is een blokkade van plexus coeliacus afgesproken. Deze blokkade is een behandeling bij ernstige pijn van de bovenbuiksorganen, zoals de maag, alvleesklier en lever. Bij deze behandeling worden een aantal zenuwen in de bovenbuik (plexus coeliacus) geblokkeerd. De meeste mensen hebben na deze verdoving minder pijn.

Vorbereidingen

U mag 6 uur voor de blokkade niet eten en drinken. Het drinken van heldere dranken mag tot 2 uur voor de behandeling.

De behandeling

U krijgt een afspraak met datum en tijdstip waarop u wordt verwacht bij de receptie van het Chirurgisch Dagcentrum, op locatie ETZ Elisabeth, route 38. U wordt genomen op het Chirurgisch Dagcentrum waar u zich kunt omkleden (in een operatiehemd). Vanaf de afdeling wordt u in een bed naar de voorbereidingsruimte gebracht.

Meer informatie over: De behandeling

Als u aan de beurt bent gaat u van daaruit naar de behandelkamer. De ingreep gebeurt onder lichte verdoving (sedatie); u krijgt hiervoor een infuus. U neemt op de buik plaats op de behandelafel. Met behulp van röntgendoorlichting wordt de plaats van de injectie bepaald. Deze plek wordt gemarkeerd, gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd.

Vervolgens brengt de arts de naald in tot vlak bij het te behandelen gebied. Door middel van contrastvloeistof wordt gecontroleerd of de naald op de goede plek zit. Vervolgens wordt er een vloeistof ingespoten (alcohol of fenol) dat het zenuwnetwerk van de bovenbuik uitschakelt. Het effect kunt u al snel merken. Na de behandeling gaat u terug naar het Chirurgisch Dagcentrum. Als alles goed is, mag u hierna snel weer naar huis. De behandeling duurt circa 30 tot 60 minuten. U verblijft tussen de twee en vier uur in het ziekenhuis.

Allergieën

Als u allergisch bent voor contrastvloeistof of medicijnen moet u dit voor de ingreep melden.

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt, zoals Sintrom®, Marcoumar® of acenocoumarol, waarvoor u onder controle bent bij de Trombosedienst, moet u met de inname hiervan vóór de behandeling stoppen. Het aantal dagen dat u met de inname van de bloedverdunners moet stoppen, hoort u van uw behandelend arts of bespreekt u met de Trombosedienst.

Bijwerkingen

Na de behandeling kunt u tijdelijk last hebben van diarree. Daarnaast kunt u in de eerste weken duizelig worden bij het plotseling opstaan. Als u rustig overeind komt, heeft u hier bijna geen last van. Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, is er een hele kleine kans op gedeeltelijke verlamming van de benen (dwarslaesie).

Let op

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Laat u daarom ophalen. Na de behandeling kunt u enkele dagen napijn hebben. Hier kunt u indien nodig paracetamol voor gebruiken. Tijdens de procedure wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling.

Resultaat

Het resultaat is na één tot twee dagen te beoordelen. Meestal is er een duidelijke pijnvermindering. Dit effect houdt enige maanden aan. Indien nodig kan de behandeling herhaald worden. Soms is er een andere, aanvullende behandeling nodig.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Pijncentrum: (013) 221 04 10. Email: pijnbehandeling@etz.nl

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00