

# Drukmeting van de slokdarm (slokdarm manometrie)

De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te nemen:



- 1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of scan de QR code.
- 2 Download de app
- 3 Accepteer de push notificaties
- 4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
- 5 Selecteer de juiste behandeling en druk op 'Start'.

## Welkom

---

### Welkom

**Welkom in het ETZ. In deze app vindt u alle informatie over het onderzoek; drukmeting in de slokdarm (slokdarm manometrie).**

## Algemene informatie

---

### Wat is drukmeting van de slokdarm?

**De slokdarm is een buisvormig deel van het maagdarmkanaal, dat het voedsel van de keel naar de maag transporteert.**

### Meer informatie over: Wat is drukmeting van de slokdarm?

De slokdarm wordt zowel bovenaan als onderaan begrensd door een sluitspier. Na het slikken opent de bovenste sluitspier zich. Met behulp van zwaartekracht en bewegingen van de slokdarm gaat het voedsel naar de maag, waar de onderste sluitspier zich ontspant.

Het meten van de druk in de slokdarm geeft belangrijke informatie over het functioneren van de beide sluitspiers van de slokdarm. Dit meten gebeurt met een katheter met meetpunten op verschillende niveaus, zowel in rust als na het slikken.

# Vorbereiding op het onderzoek

---

## Vorbereiding op het onderzoek

- **U mag tot 4 uur voor het onderzoek een lichte maaltijd eten (een kopje thee en een beschuit). Als u bekend bent met ernstige passagestoornissen van de slokdarm dan krijgt u een andere voorbereiding.**

## Medicatie

**Gebruikt u medicijnen voor uw slokdarm of maag, dan krijgt u uitleg van uw arts over het gebruik. Het kan dat u met inname van deze medicijnen een week voor het onderzoek moet stoppen; soms moet u ze juist blijven door gebruiken. De arts bespreekt dit met u op de polikliniek.**

## Het onderzoek

---

### Waar meldt u zich?

**Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd. Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt. Op beide locaties meldt u zich aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van het ziekenhuis. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm en neem plaats in de aangegeven wachtkamer. U wordt daar opgeroepen zodra u aan de beurt bent.**

### Het onderzoek

**Via de neus wordt een katheter (slangetje) ingebracht. Op het moment dat u de katheter in uw keel voelt buigt u uw hoofd voorover en neemt u enkele slokjes water, waardoor de katheter makkelijker verplaatst richting de slokdarm. De positie in de keel kan kokhalzen veroorzaken, dit neemt af naarmate de katheter verder wordt ingebracht.**

### Meer informatie over: Het onderzoek

Dit inbrengen is niet pijnlijk, maar kan wel een vervelend gevoel geven. Bovenin de neus geeft het een prikkend gevoel, achter in de keel kunt u een kokhalsreflex krijgen. De verpleegkundige vraagt u af en toe een slokje water te nemen. Op het moment dat u slikt, schuift de verpleegkundige het slangetje naar binnen richting uw maag. Zit de katheter eenmaal op zijn plek, dan voelt het nog wel raar aan. De katheter wordt op zijn plaats gehouden met een neuspleister.

Daarna gaat u op uw rug liggen met het hoofdeinde een stukje omhoog. Aan het uiteinde van de katheter zitten meetpunten, steeds 5cm van elkaar. De katheter is verbonden met een computer, waarop via een speciaal programma de activiteit van de slokdarm wordt gemeten. Tijdens het onderzoek moet u een tiental kleine slokjes water nemen in diverse posities (zittend, liggend etc.). Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

## Na het onderzoek

---

### Na het onderzoek

**Na het onderzoek kunt u weer eten en drinken, zoals u gewend bent. Ook kunt u de**

gebruikelijke medicijnen weer innemen.

## Risico's en complicaties

Dit onderzoek kent geen specifieke risico's. Een enkele keer wordt er een beetje bloedverlies gezien door oppervlakkige beschadiging van het neusslijmvlies. De keel kan geïrriteerd aanvoelen, wat extra drinken verhelpt dit.

## De uitslag

Het duurt ongeveer 6 weken tot de uitslag van het onderzoek bekend is. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts op de polikliniek.

## Tot slot

---

### Ziekte, verhindering of vragen

Als u niet naar uw afspraak kunt komen, neem dan contact op met de polikliniek MDL. Als u vragen heeft kunt u die vooraf aan het onderzoek stellen aan de verpleegkundige die het onderzoek uitvoert of tijdens kantooruren bellen naar de polikliniek.

## Contact

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ): (013) 221 00 00

Polikliniek MDL: (013) 221 02 00

Website: <https://www.etz.nl/mdl>

Locatie ETZ Elisabeth  
Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg

Locatie ETZ TweeSteden  
Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg