

Entropion

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Klachten	1
Oorzaken	1
Operatieve correctie	1
Bloedverdunnende middelen	2
Bijwerkingen en complicaties	2
Waarschuwing	2
Verwijderen van hechtingen en controle	2
Tot slot	2
Belangrijke telefoonnummers	3

U wordt verwacht in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) voor een poliklinische ingreep aan een entropion. Een entropion is een naar binnen gedraaide rand van het onderooglid. De oogleden rollen met het onderooglid mee naar binnen toe. Hierdoor kunnen de oogleden tegen het hoornvlies aan komen en het hoornvlies beschadigen. Soms is het entropion niet altijd aanwezig maar rolt het onderooglid naar binnen bij het dichtknijpen van de oogleden.

Klachten

Een aantal klachten die door een entropion veroorzaakt kunnen worden zijn pijn, irritatie, roodheid, last van licht en een gevoel alsof er zand in het oog zit. Dit komt door het krassen van de haren van het onderooglid tegen het hoornvlies.

Oorzaken

Entropion wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de weefsels van het ooglid, waardoor zowel in horizontale als verticale richting verslapping optreedt. In zeldzame gevallen kan het veroorzaakt worden door de vorming van littekenweefsel aan de binnenzijde van het onderooglid.

Operatieve correctie

Wanneer het entropion het gevolg is van veroudering kan het verholpen worden door zowel de horizontale slappe als de verticale slappe van het onderooglid te corrigeren.

- Horizontale slappe wordt gecorrigeerd door het ooglid in de buitenste ooghoek strakker te zetten.
- Correctie van verticale slappe gebeurt door een snee onder de ooglidrand te maken en via deze snee de spier die het onderooglid naar buiten draait strakker te zetten.

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 30 minuten.

Bloedverdunnende middelen

U moet uw medicijngebruik doorgeven aan uw oogarts. De oogarts bepaalt in overleg met uw behandelend arts of u wel of niet moet stoppen met het slikken van de bloedverdunnende middelen. Bij twijfel neemt u altijd contact op met polikliniek Oogheelkunde.

Bijwerkingen en complicaties

- Tijdens de eerste week na de operatie kan er eventueel wat afscheiding uit het oog komen. Dit is ingedroogd wondvocht. Het is niet iets om u zorgen over te maken. Eventueel voorzichtig deppen met lauwwarm water is voldoende om de afscheiding te verwijderen. Zorgt u er wel voor dat de hechtingen droog blijven.
- Het ooglid kan de eerste weken wat gevoelig blijven, dit wordt geleidelijk minder.
- Soms ontwikkelt zich een zwelling in de ooghoek als reactie op de hechtmaterialen. Dit geneest meestal spontaan. Neem wel altijd contact op met de assistente.
- Bij een aantal geopereerde patiënten ontstaat er een over-correctie, dit betekent dat het ooglid na de operatie te ver naar buiten gekanteld staat. Meestal geneest dit binnen 6 weken spontaan. Mocht dit niet zo zijn neem dan contact op met de oogarts. Mogelijk volgt er dan een aanvullende operatie.
- Mocht u andere klachten krijgen, bel altijd voor overleg met de polikliniek. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8.30- 17.00 uur

Ooglidoperaties zijn niet gevaarlijk. Zoals aan elke operatie is er toch een risico aan verbonden. Een blauw oog komt vaak voor, maar geneest snel. Lelijke littekens en infecties treden zeer zeldzaam op. De ernstigste complicatie van een ooglidoperatie is blindheid. Dit komt bij minder dan 1 op de 5000 operaties voor. De oorzaak is een bloeding na de operatie waarbij het bloed zich ophoopt in de oogkas. Daardoor raken de oogzenuw en het oog beklemd.

Waarschuwing

Wanneer u na een ooglidoperatie merkt dat het oog gaat uitpuilen of dat u minder gaat zien, moet u direct contact op te nemen met uw oogarts of direct naar het ziekenhuis te gaan.

Verwijderen van hechtingen en controle

De hechtingen worden gemiddeld na 10 dagen verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak.

Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00
Polikliniek Oogheelkunde: (013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Route 28

Locatie ETZ TweeSteden
Route 1B

Oogheelkunde, 43.1092 04-20

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

U wordt verwacht op omuur

Op locatie

Datum hechtingen verwijderen op.....om.....uur

A.u.b melden aan de balie.