

# Blokkade van het ganglion stellatum

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

## Blokkade van het ganglion stellatum

---

### **blokkade van het ganglion stellatum**

**In overleg met uw behandelend arts is een blokkade van het ganglion stellatum afgesproken, omdat pijnbestrijding met medicijnen onvoldoende pijnstilling geeft. Deze behandeling kan overwogen worden bij sommige pijnsyndromen in de nek, schouder, borst en/of arm. Bij de behandeling wordt een bepaalde zenuwknoop verdoofd. Deze behandeling wordt soms ook toegepast bij bepaalde aandoeningen waarbij de doorbloeding van de arm verstoord is.**

### **Wat is het ganglion stellatum**

**Het ganglion stellatum is een zenuwknoop aan de voorzijde van de nek. Deze zenuwknoop maakt deel uit van het onwillekeurige zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel regelt allerlei 'automatische' processen, zoals de doorbloeding. Deze zenuwknoop bevindt zich aan de voorzijde van de zevende halswervel.**

### **Vorbereidingen**

**Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.**

### **De behandeling**

**U krijgt een afspraak mee met datum en tijdstip waarop u wordt verwacht bij de receptie van het Chirurgisch Dagcentrum, op locatie ETZ Elisabeth, route 38. U wordt genomen op het Chirurgisch Dagcentrum waar u zich kunt omkleden (dagbehandeling). Vanaf de afdeling wordt u in een bed naar de voorbereidingsruimte gebracht.**

### **Meer informatie over: De behandeling**

U krijgt een afspraak mee met datum en tijdstip waarop u wordt verwacht bij de receptie van het Chirurgisch Dagcentrum, op locatie ETZ Elisabeth, route 38. U wordt genomen op het Chirurgisch Dagcentrum waar u zich kunt omkleden (dagbehandeling). Vanaf de afdeling wordt u in een bed naar de voorbereidingsruimte gebracht.

Als u aan de beurt bent gaat u van daaruit naar de behandelkamer. U neemt op de rug plaats op de behandeltafel. Met behulp van röntgendoorlichting plaatst de arts de naald in de hals ter hoogte van het ganglion stellatum. Door middel van contrastvloeistof wordt de positie van de naald gecontroleerd.

Vervolgens spuit de arts een verdovingsmiddel in. Als er al een proefbehandeling met een lokaal verdovingsmiddel heeft plaatsgevonden, kan er ook een radiofrequente (RF) behandeling gedaan worden. Bij een RF behandeling wordt de naald door radiofrequente stroom verwarmd om de zenuwknoop langdurig uit te schakelen. Na de behandeling gaat u terug naar het Chirurgisch Dagcentrum. Als alles goed is, mag u hierna snel weer naar huis. De behandeling duurt 15 tot 20 minuten. U verblijft tussen de twee en drie uur in het ziekenhuis.

## Allergieën

**Als u allergisch bent voor contrastvloeistof of medicijnen moet u dit voor de ingreep melden.**

## Bloedverduunners

**Als u bloedverduunners gebruikt, zoals Sintrom®, Marcoumar® of acenocoumarol, waarvoor u onder controle bent bij de Trombosedienst, moet u met de inname hiervan vóór de behandeling stoppen. Het aantal dagen dat u met de inname van de bloedverduunners moet stoppen, hoort u van uw behandelend arts of bespreekt u met de Trombosedienst.**

## Bijwerkingen

**Er is een kans dat er een bloeduitstorting (blauwe plek) ontstaat. Direct na de behandeling kunt u nog klachten hebben die worden veroorzaakt door de verdoving:**

- wazig zien met het oog aan de behandelde kant;
- afhankelijk ooglid;
- hese stem;
- moeite met slikken.

**Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen een paar uur.**

## Let op

**Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Laat u daarom ophalen. Na de behandeling kunt u enkele dagen napijn hebben. Hier kunt u zo nodig paracetamol voor gebruiken. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Als u zwanger bent, of er is een kans dat u zwanger bent, moet u dit voor de behandeling melden.**

## Resultaat

**Pas na één tot twee weken is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het uiteindelijke effect wordt dan ook besproken door middel van een poliklinische afspraak of een telefonische controle waarbij de pijnspecialist u belt.**

## Tot slot

**Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Pijncentrum: Locatie ETZ Elisabeth Pijncentrum: (013) 221 04 10. Email: pijnbehandeling@etz.nl**

**ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00.**