

**PRIMIDON**

Primidon in serum

**Zie** [synoniemen] → Mysoline**Monstermateriaal** Stolbuis met rode dop (zonder gel)**Hoeveelheid** 1 volle buis (6 ml)**LIMS-code** PRIMG**Opmerkingen** Dalspiegel afnemen vlak voor de volgende gift.  
Gezien de grote variatie in klaring is het bepalen van serumconcentraties noodzakelijk. Circa 2 weken na start kan een bloedmonster worden afgenomen vlak voor de eerstvolgende gift.**Referentiewaarden** Therapeutisch:  
Primidon: 10-15 mg/l  
Fenobarbital: 1-2 keer de spiegel van primidon (monotherapie) tot 2-5 keer de spiegel van primidon (in combinatie met andere anti-epileptica).**Opmerking** Fenobarbital is een actieve metaboliet van primidon, daarom wordt naast primidon ook fenobarbital gemeten.Voor meer informatie zie [www.tdm-monografie.org](http://www.tdm-monografie.org).**Bewaarconditie** Koelkast (2-8 °C)**Frequentie** Bepaling op dinsdag en vrijdag.**Uitvoerende instelling** Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ**Contactpersoon** Dienstdoende ziekenhuisapotheker ETZ, tel. 013-2215696**Transportcondities** Kamertemperatuur (15-25 °C)**NB****Bepalingsmethode** LC-MS/MS**Aanwijzingen voor analist****Externe kwaliteitscontrole** LGC

**Literatuur**

1. TDM monografie Primidon, NVZA Commissie Analyse & Toxicologie (versie 30-10-2014), geraadpleegd via [www.tdm-monografie.org](http://www.tdm-monografie.org) op 13-05-2020.
2. KNMP kennisbank, geraadpleegd op 13-05-2020.

**Wijzigingen**

20210106 KL: uitvoerende instelling Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ZiekenhuisApotheek Midden-Brabant Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis wordt Klinisch Farmaceutisch Laboratorium ETZ. LIMS-code van PRIMB of PRIMT naar PRIMG.