

# Sedatie bij endoscopisch onderzoek

De inhoud van deze folder komt uit onze ETZ behandelwijzer app. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

## Welkom

---

### Welkom

**Soms vindt een endoscopisch onderzoek onder sedatie plaats. In deze app leest u wat sedatie is en hoe het werkt.**

#### Meer informatie over: ETZ

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners in de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.

Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. We gaan met patiënten in gesprek over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren we onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

## Sedatie

---

### Wat is sedatie?

**Sedatie, ook wel roesje genoemd, is een combinatie van een slaapmiddel en/of een pijnstiller.**

#### Meer informatie over: Wat is sedatie?

Het doel van sedatie is dat u wat slaperig wordt, zodat het onderzoek voor u minder belastend is. Deze slaperigheid treedt direct na toediening op. Hoe slaperig u bent, is niet te voorspellen. Ook als u niet slaapt, ondergaat u het onderzoek meer ontspannen.

We streven naar een vorm van zogenaamde 'bewuste sedatie'. Daarbij bent u wat slaperig, maar kunnen de maag-darm-leverarts en verpleegkundigen tijdens het onderzoek nog wel met u praten. Mocht het nodig zijn, dan kan de maag-darm-leverarts u tijdens het onderzoek nog extra medicatie toedienen.

### Waar meldt u zich

**Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd. Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt:**

**Op beide locaties meldt u zich aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van het ziekenhuis. Daarna kunt u in de wachtkamer van de afdeling Endoscopie plaatsnemen.**

- **ETZ Elisabeth: afdeling Endoscopie (Etage F)**
- **ETZ TweeSteden: afdeling Endoscopie (route 59).**

## **Hoe wordt sedatie toegediend?**

**Bij sedatie krijgt u via een infuusnaald een geneesmiddel (Midazolam). Dit middel werkt rustgevend, spierontspannend en vermindert angstgevoelens. Het is geen narcose. Soms wordt ook een pijnstiller (Fentanyl) toegediend.**

## **Sufheid**

**Na het onderzoek slaapt u ongeveer één tot anderhalf uur uit. Het rustgevende middel dat u is toegediend veroorzaakt ook sufheid.**

### **Meer informatie over: Sufheid**

Door de sufheid mag u 12 uur na het onderzoek niet zelf aan het verkeer deelnemen (dus niet autorijden of fietsen). Ook kunt u niet alleen met het openbaar vervoer reizen. U moet dus vóór het onderzoek voor vervoer en begeleiding naar huis zorgen. Als u niet voor vervoer gezorgd heeft, is de arts genoodzaakt af te zien van sedatie.

## **Bijwerkingen**

---

### **Risico's**

**Een roesje brengt een risico met zich mee in de vorm van ademhalingsproblemen en/of problemen met het hart.**

### **Meer informatie over: Risico's**

De risico's zijn het grootst voor mensen die ouder zijn dan zeventig jaar en bekend zijn met aandoeningen aan onder andere het hart en/of de longen. De definitieve beslissing over het wel of niet inzetten van een roesje kan pas vlak voor het onderzoek, in overleg met u, worden genomen door de maag-darm-leverarts die het onderzoek uitvoert.

## **Bijwerkingen**

**De volgende bijwerkingen kunnen optreden.**

### **Meer informatie over: Bijwerkingen**

- Verminderde ademhaling en een enkele keer bloeddrukdaling.
- Slaperigheid en verminderde alertheid, ook nog uren na het onderzoek.
- In plaats van rust wordt u onrustig en verward (komt zelden voor).
- Door het geneesmiddel is het mogelijk dat u zich niet goed kunt herinneren wat er allemaal gebeurd

is (geheugenverlies). Dit is een normaal verschijnsel.

## Na het onderzoek

---

### Adviezen

**Het kan zo zijn dat u zich weinig tot niets meer van het onderzoek herinnert. Dit is normaal en komt door het rustgevende geneesmiddel. Daarom hierbij nog de volgende adviezen op een rij.**

#### Meer informatie over: Adviezen

- Verricht geen activiteiten waarbij coördinatie of alertheid nodig is. Bijvoorbeeld autorijden, fietsen, machines of elektrisch gereedschap bedienen, koken, klimmen enzovoorts. Als u een ongeval veroorzaakt, bent u onverzekerd.
- Neem geen belangrijke beslissingen in de eerste 24 uur, zoals een contract tekenen.
- Gebruik gedurende 24 uur geen alcohol.

## Tot slot

---

### Vragen

**Als u nog vragen heeft, neem contact op met uw arts.**