

Mogelijke klachten bij darmkanker

BLOED IN DE POEP

Als bloed vermengd is met poep. Bloed rondom de poep en/of bij het afvegen past meer bij aambeien.

AANHOUDENDE BUIKPIJN

Bij buikpijn die na het poepen niet weggaat. Als de buikpijn wel afneemt na het poepen, past het vaak meer bij een prikkelbare darm.

Darmkanker is meestal goed te behandelen als de kanker op tijd wordt ontdekt.

Neem bij klachten contact op met de huisarts.

Wacht niet op een uitnodiging van het bevolkingsonderzoek.

ONGEWENST GEWICHTSVERLIES

Als je onbewust blijft afvallen.

VERMOEIDHEID OF DUIZELIGHEID DOOR BLOEDARMOEDE

Blijvende vermoeidheid en/of duizeligheid door bloedarmoede doordat je bloed verliest in de darm.

LOZE AANDRANG

Je hebt het gevoel dat je moet poepen maar als je perst, lukt het poepen niet.

MINDER EETLUST

Gebrek aan eetlust, mogelijk door een vol gevoel.

VERANDERING TOILETGANG

Aanhoudende verandering bij het aantal keer dat je moet poepen of je poep ziet er anders uit (zoals diarree, verstopping of slijm).