

Antibiotica thuis (via het infuus)

Na overleg tussen uw behandelend arts en de internist-infectioloog is samen met u besloten dat intraveneuze (via het infuus) toediening van antibiotica de beste behandeloptie voor u is. Intraveneuze antibiotica worden veelal toegediend in het ziekenhuis, maar kunnen ook goed en veilig thuis worden gegeven. Daarvoor heeft het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) het zogenaamde OPAT-programma ontwikkeld. Deze folder geeft u hierover meer informatie.

OPAT

OPAT is de afkorting voor "Outpatient Parenteraal Antimicrobiële Therapie"

Outpatient	niet het ziekenhuis
Parenteraal	toediening via een bloedvat (intraveneus)
Antimicrobieel	geneesmiddelen die actief zijn tegen micro-organismen die (ernstige) infecties kunnen veroorzaken

Doel

Het voornaamste doel van het OPAT-programma is de behandeling op een veilige en doeltreffende manier in uw eigen thuisomgeving te laten plaatsvinden, zodat u uw dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk kunt hervatten.

Werkwijze

Er zijn twee veelgebruikte manieren om de antibiotica toe te dienen

1. Met een infuuszak en een mobiele pomp. De pomp zit in een tasje aan een infuuslijn naar de bovenarm verbonden. De pomp werkt op een accu die opgeladen moet worden in de nacht. Overdag bent u mobiel.
2. Met een zogenaamde elastomeerpomp, een pomp ter grootte van een sinaasappel die in een vastgestelde tijd automatisch leegloopt. De pomp zit in een heuptasje met een infuuslijn naar de bovenarm. Omdat de pomp niet afhankelijk is van stroom of batterijen, zijn vrijwel alle dagelijkse activiteiten mogelijk.

De veiligheid van de zorg staat voorop, daarom staat u onder intensieve controle. Logistiek wordt u alle zorg uit handen genomen: het ziekenhuis stemt met de apotheek af welke medicatie wanneer geleverd moet worden. Dagelijks bezoekt een gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg u, en één keer per week wordt de insteekopening van de infuuslijn (PICC) verzorgd. Afhankelijk van de te behandelen infectie en de duur van de behandeling, wordt ook bloed afgenomen om bijwerkingen en succes van de therapie te vervolgen.

Voordelen

- De toediening van de antibiotica kan plaatsvinden in uw vertrouwde omgeving.
- U behoudt uw vrijheid en kunt vrijwel alle dagelijkse activiteiten hervatten.

Nadelen

- Er kan een allergische reactie optreden, maar het risico daarop is niet groter dan in het ziekenhuis.
- De infuuslijn (PICC) kan blokkeren, verstopt raken of een trombose geven. Dat is echter zeldzaam.

Wanneer contact opnemen

Complicaties zijn zeldzaam, maar problemen kunnen ontstaan. Dat kan altijd gebeuren, of u nu thuis of in het ziekenhuis bent. Aarzel niet om contact op te nemen met het OPAT-team als u zich zorgen maakt. De contactgegevens staan vermeld aan het eind van deze folder.

Neem direct contact op met de gespecialiseerd verpleegkundige van de thuiszorg in de volgende situaties:

- tekenen van trombose: herkenbaar aan pijn aan de arm of schouder, zwelling en roodheid;
- tekenen van kortademigheid, pijn bij het hoesten ter hoogte van de borstkas of bewustzijnsverlies;
- koorts (een temperatuur van 38.5 C of hoger).

Daarnaast ook:

- bij een mogelijke ontsteking rondom de insteekopening. U merkt dit aan roodheid, zwelling, pijn, warmte en/of vocht (pus);
- als u pijn heeft tijdens het toedienen van de medicijnen;
- bij een barst in de infuuslijn;
- bij een geblokkeerde infuuslijn;
- bij het loslaten van het afsluitdopje;
- huiduitslag;
- ernstige diarree;
- zwelling van het gezicht.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

OPAT-team: (013) 221 23 35

- Mw. B. de Kruijf, verpleegkundig specialist
- Drs. M. Berrevoets, internist-infectioloog
- Mw. T. Leenders, ziekenhuisapotheker

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mail: A-team@etz.nl

Thuiszorgorganisaties (24 uur per dag bereikbaar):

Thebe: 088 117 81 42

De Wever: 0800 565 65 67