

Apexresectie

De inhoud van deze folder komt uit onze ETZ behandelwijzer app. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Welkom

Welkom

Je hebt de behandeling apexresectie ondergaan. Het doel hiervan is de aan de wortelpunt aanwezige ontsteking weg te nemen. Alle informatie belangrijk na afloop lees je in deze app.

Meer informatie over: ETZ


Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.

Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat.

Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

De behandeling

Hechtingen



Bij een apexresectie wordt het wortelkanaal afgesloten met een rubberen stift of met ander vulmateriaal. De wond is met oplosbare hechtingen gesloten.

Meer informatie over: Hechtingen

Hechtingen lossen na 1 tot 2 weken vanzelf op. Als er niet oplosbare hechtingen gebruikt zijn, krijg je een afspraak op polikliniek Mond-, kaak- en Aangezichtschirurgie voor het verwijderen van de hechtingen.

Klachten na behandeling

De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is normaal dat de volgende verschijnselen zich voordoen.

Pijnbestrijding

Heeft je MKA-chirurg geen pijnstiller voorgeschreven, dan kun je 1 -2 tabletten paracetamol van 500 mg per stuk innemen, met een maximum van 3 gram (6 tabletten) per dag.

Meer informatie over: Pijnbestrijding

Gebruik **geen** Aspirine® deze geven een grotere kans op nabloeding. Neem de pijnstiller voordat de verdoving is uitgewerkt, bijvoorbeeld direct bij thuiskomst.

Waar moet ik op letten?

Mondverzorging

Het schoonhouden van de mond is van groot belang. Je kunt de tanden, met een zachte tandenborstel, gewoon poetsen.

Meer informatie over: Mondverzorging

Aanvullend kun je spoelen met lauw zout water (een flinke theelepel zout oplossen in een glas lauw water). Maak je mond schoon na **alle** maaltijden en ook 's avonds voordat je gaat slapen. Eventueel krijg je een recept mee voor een mondspoeling.

Roken

Je mag de eerste 5 dagen na de behandeling niet roken. Dat heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.

Zwelling

Om zwelling te voorkomen, moet je op de eerste dag koelen. Dit doe je 3 keer per dag, gedurende 20 minuten.

Meer informatie over: Zwelling

Houd een plastic zakje met ijs tegen de wang. Het is belangrijk dat je meteen koelt omdat het na één dag geen effect meer heeft. In plaats van een zakje ijs kun je ook een koelelement met daaromheen een washandje gebruiken. Je kunt het beste de eerste nacht wat meer rechtop slapen (neem een extra hoofdkussen) en ga niet op de behandelde zijde liggen.

Noodvulling

Als de behandelde tand of kies een noodvulling heeft, moet deze na genezing van de wond vervangen worden door een blijvende vulling. Hiervoor maak je een afspraak bij de tandarts.

Complicaties

Complicaties

Zoals bij elke ingreep, is er een kans op complicaties.

Meer informatie over: Complicaties

Er kan een nabloeding optreden. Vouw dan een verbandgaas dubbel of een zakdoek en leg deze op de operatiewond. Druk dit daarna gedurende dertig minuten stevig aan. Als dat niet helpt, bel dan de polikliniek Mond-, kaak- en Aangezichtschirurgie. Neem ook contact op met de polikliniek wanneer een van de volgende situaties zich voordoet:

- de klachten nemen na 4 dagen toe;
- de zwelling neemt niet af;
- je krijgt koorts boven de 38,5°C;
- je maakt je zorgen