

Azathioprine (Imuran)

Longgeneeskunde

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Gebruik	1
Aandachtspunten	1
Bijwerkingen	2
Gebruik bij zwangerschapswens	2
Vragen	3
Belangrijke telefoonnummers	3

U heeft in overleg met uw behandelend specialist besloten, dat u het medicijn Azathioprine gaat gebruiken in verband met een interstitiële longaandoening. Deze folder geeft u informatie over dit medicijn.

Azathioprine wordt gebruikt bij patiënten met interstitiële longziekten zoals chronische extrinsieke allergische alveolitis en sarcoidose. Azathioprine wordt ook veel gebruikt binnen de reumatologie.

Gebruik

Azathioprine wordt toegediend in tabletten van 25 mg of 50 mg. De dosering kunt u in 1 keer innemen of dosering verdelen over 2 momenten op de dag. Neem deze tabletten in hun geheel in met water en bij voorkeur na de maaltijd. Door de tabletten na het eten in te nemen, heeft u minder last van maagdarmklachten, zoals verminderde eetlust, misselijkheid en braken. Melkproducten 1 of 2 uur na of voor de inname nuttigen.

Dit middel onderdrukt het beenmerg, waar de voorlopers van nieuwe bloedcellen worden gemaakt. Met name bij hoge dosering kan er een tekort aan bepaalde bloedcellen ontstaan. Het gevolg kan dan bloedarmoede zijn, meer kans op bloedingen en een verminderde afweer. Dit kan al na enkele weken ontstaan. Het bloed wordt daarom regelmatig gecontroleerd. Mochten er afwijkingen zijn in het bloed, dan wordt tijdelijk gestopt met de inname van Azathioprine of wordt de dosis verlaagd. Vooraf wordt uw bloed getest op overgevoeligheid van azathioprine (TPMT test), dit is een test die mogelijk het risico op bijwerkingen kan voorspellen. De behandelend arts kan bij een afwijkende uitslag ervoor kiezen u een lagere dosering dan gebruikelijk voor te schrijven. Hierdoor verdwijnt deze bijwerking weer. Krijgt u last van erge keelpijn, koorts, groen sputum (slijm), regelmatig een bloedneus en/of snel blauwe plekken, neem dan contact op. Ook bij een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid moet u contact op nemen met uw behandelend specialist of de ILD-verpleegkundige.

Aandachtspunten

U wordt geadviseerd alcohol te beperken, bij voorkeur zo min mogelijk en maximaal 1 á 2 eenheden per dag. Geen levend vaccin nemen, zoals reisvaccinaties. De griepvaccinatie mag wel en deze adviseren wij u zelfs.

Zorg dat u blootstelling aan UV-licht (zon) beperkt door het dragen van beschermende kleding en gebruik maken van een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 20-30).

Als u naast Azathioprine tevens middelen gebruikt tegen de jicht (Allopurinol of Zyloric) dan moet u uw arts dit laten weten. De dosis Azathioprine moet dan verminderd worden wegens grotere kans op bijwerkingen.

Azathioprine is een cytostaticum, een risicogeneesmiddel, en kan daarom gevaarlijk zijn voor derden: u moet de tablet zelf uit de verpakking nemen. Als een ander dit doet, moet hij/zij disposable handschoenen dragen. Afval mag zonder voorzorgsmaatregelen in de vuilnisbak gedeponeerd worden.

Bijwerkingen

Bij het gebruik van Azathioprine kunnen in een aantal gevallen bijwerkingen voorkomen, die meestal van voorbijgaande aard zijn na tijdelijk staken of verlagen van de dosis. Soms is het noodzakelijk het middel definitief te staken.

- Verhoogde kans op infecties. Azathioprine heeft een remmend effect op het beenmerg, het onderdrukt het natuurlijke immuunsysteem en hiermee de afweer.
- Koorts (door overgevoeligheid voor Azathioprine of ten gevolge van infecties) bij een temperatuur van 38,5°C of hoger, neemt u contact op met uw longarts of de ILD-verpleegkundige.
- Huiduitslag.
- Leverfunctiestoornissen (soms gepaard met misselijkheid, minder eetlust en koorts).
- Spontane blauwe plekken. Dit is ook het gevolg van beenmergremming door Azathioprine waardoor de aanmaak van bloedplaatjes vermindert.

Door regelmatig het bloed te laten controleren, kan een aantal bijwerkingen (leverfunctiestoornissen, afwijkende aanmaak bloedcellen) vroegtijdig worden opgespoord.

Houdt u zich daarom goed aan de **afspraken voor bloedcontroles**.

Week 1, 2, 3, 4, 6 en 8 na start met de inname van Azathioprine.

Als één of meerdere van de genoemde klachten enige tijd blijven aanhouden, wordt u verzocht contact op te nemen met uw (behandelend) arts of ILD-verpleegkundige.

Gebruik bij zwangerschapswens

Bij gebruik van Azathioprine door de vrouw: een ruime hoeveelheid gegevens over het gebruik van azathioprine tijdens de zwangerschap wijst niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen.

Bij gebruik van Azathioprine door de man zijn er geen aanwijzingen dat Azathioprine de zwangerschap nadelig beïnvloedt.

Er wordt zwangerschapsbegeleiding geadviseerd door een gynaecoloog.

Er zijn tot nog toe geen nadelige effecten op zuigelingen gemeld tijdens het geven van borstvoeding bij moeders die Azathioprine gebruiken. Wacht eventueel met het geven van borstvoeding tot 4-6 uur na inname van Azathioprine.

Vragen

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek Longziekten, telefoonnummer (013) 221 0260. Of maak gebruik van het telefonisch spreekuur ILD-telefoonnummer (013) 221 0267.

week	Datum bloedprikken	Datum uitslag telefonisch
1		
2		
3		
4		
6		
8		

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Polikliniek Longgeneeskunde: (013) 221 02 60

Longgeneeskunde, 41_1585 06-20

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.