

# Blaasspoeling met Mitomycine

De inhoud van deze folder komt uit onze ETZ behandelwijzer app. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

## Welkom

---

### Inleiding



Welkom in de app van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis. We gebruiken deze app om u zo goed mogelijk te informeren over uw behandeling.

### Blaasspoeling met Mitomycine

In deze app van het ETZ geven wij u uitleg over blaasspoelingen met Mitomycine op de dagbehandeling.

### Waarom blaasspoeling met Mitomycine

Uw uroloog heeft in uw blaas een tumor(en) geconstateerd die beperkt is tot het blaasslijmvlies.

#### Meer informatie over: Waarom blaasspoeling met Mitomycine

Met een operatie via de plasbuis kunnen de tumoren worden verwijderd. Deze operatie heeft een TURT (TransUrethrale Resectie van een Tumor). bij 60-70% van de mensen keren de tumoren echter terug en zouden dan verder de blaaswand in kunnen groeien. Met behulp van Mitomycine spoelingen is het mogelijk de kans te verkleinen dat de tumoren terug komen.

### Wat zijn Mitomycine spoelingen?

Mitomycine is een cytostatica ofwel een geneesmiddel dat een remmende werking heeft op de celdeling. Mitomycine werkt op de snel delende cellen zoals kankercellen en minder sterk op gezonde cellen. Mitomycine wordt rechtstreeks in de blaas toegediend.

### Hoeveel blaasspoelingen zijn nodig?

De blaasspoelingen kunnen op diverse momenten gegeven worden:

- Binnen 6-24 uur na de TURT operatie
- Vierwekelijkse spoelingen, gevolgd door zeven spoelingen eenmaal per week

# De blaasspoelingen

---

## Vorbereiding op de blaasspoeling

**Het is belangrijk dat u met een lege blaas naar het ziekenhuis komt, het is te adviseren om enkele uren voor de spoeling zo weinig mogelijk te drinken.**

## Hoe verloopt de blaasspoeling

**De blaasspoeling wordt gegeven op het oncologisch dagcentrum van het ETZ op de afgesproken tijd en locatie.**

### Meer informatie over: Hoe verloopt de blaasspoeling

Een verpleegkundige van deze afdeling ontvangt u en start vervolgens de procedure, waarbij u met een ontbloot onderlichaam plaats neemt op een behandeltafel. De verpleegkundige maakt het gebied rondom de opening van de plasbuis schoon en brengt vervolgens een eenmalige katheter in, waardoor de spoeling gegeven kan worden. De katheter is voorzien van een glijmiddel zodat het inbrengen makkelijker gaat.

Na het inbrengen van de spoelvloeistof (BCG) verwijdert de verpleegkundige de eenmalige katheter en kunt u zichzelf weer aankleden. Als het nodig is krijgt u van de verpleegkundige een inlegverband om eventuele lekkage/ incontinentie op te vangen.

De secretaresse maakt met u een nieuwe afspraak voor een eventuele vervolg spoeling, hierna mag u weer naar huis.

De spoeling dient u minimaal 1 uur in te houden, dit heeft het beste effect. Probeer in die tijd niet teveel vocht binnen te krijgen. Laat de spoeling maximaal 2 uur in.

## Na de blaasspoeling

**Thuis plast u na ongeveer een uur de spoeling weer uit in het toilet, de urine kan een grijs-zwarte kleur hebben door de spoeling.**

### Meer informatie over: Na de blaasspoeling

- Het is belangrijk dat u niet met uw handen in aanraking komt met de vloeistof. Bij huidcontacten kan u het beste de huid direct afwassen met water.
- U moet zittend plassen om spatten en verspreiden van de mitomycine te voorkomen.
- Spoel na het toiletgebruik twee maal door met het toiletdeksel naar beneden en was de handen met zeep.
- Maak dagelijks het toilet schoon met een ph- neutrale zeep (geen chloor of bleek).
- Reinig de geslachtsdelen zorgvuldig met veel water.
- Heb geen geslachtsgemeenschap gedurende 48 uur na toediening van de spoeling.
- Indien er vloeistof op de kleding is gemorst dan kan deze gewoon in de wasmachine, u moet de kleding dan wel eerst spoelen met een koud wasprogramma.
- Drink veel om de vloeistof uit de blaas te spoelen (1,5- 2 liter per dag).

Bovenstaande maatregelen gelden gedurende 48 uur.

# Bijwerkingen

---

## Mogelijke bijwerkingen

### Mogelijke bijwerkingen van de Mitomycine spoeling:

#### Meer informatie over: Mogelijke bijwerkingen

- Mitomycine kan de werking van bloedverdunners beïnvloeden.
- Vrouwen mogen niet zwanger worden, anticonceptie dient tot minimaal drie maanden in de kuur te worden gebruikt.
- In combinatie met andere medicijnen kan Mitomycine de werking van vaccins verminderen en kunnen er meer bijwerkingen ontstaan.
- U kunt na de spoeling enkele dagen daarna het gevoel hebben een blaasontsteking te hebben.
- Moeite met ophouden van de urine.
- Bloed en of weefseldeeltjes in de urine.

## Klachten door de blaasspoeling



### Wanneer moet u contact opnemen:

#### Meer informatie over: Klachten door de blaasspoeling

- Als u zich in algemene zin niet lekker voelt
- U koorts heeft boven de 38,5 graden en/ of rillerig bent
- Veel bloed in de urine

Indien u een van deze klachten ervaart neem dan contact op met de regieverpleegkundige of polikliniek urologie. Buiten kantooruren neemt u contact op met de spoedeisende hulp