

Blaasspoeling met mitomycine (verpleegafdeling)

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.



Welkom

Inleiding



Welkom in de app van het ETZ. We gebruiken deze app om u zo goed mogelijk te informeren over uw behandeling. Hierin vindt u uitleg over blaasspoelingen met mitomycine op de verpleegafdeling.

Algemene info

Waarom blaasspoeling met mitomycine?

Uw uroloog heeft in uw blaas een tumor(en) geconstateerd die beperkt is tot het slijmvlies.

Meer informatie over: Waarom blaasspoeling met mitomycine

Met een operatie via de plasbuis kunnen tumoren worden verwijderd. Deze operatie heeft een TUR (TransUrethrale Resectie van een Tumor). Bij 60-70% van de mensen keren de tumoren terug en kunnen dan verder de blaaswand in groeien. Met Mitomycine spoelingen is het mogelijk de kans te verkleinen dat de tumoren terugkomen.

Wat zijn mitomycine spoelingen?

Mitomycine is een geneesmiddel dat een remmende werking heeft op de celdeling. Mitomycine werkt op de snel delende cellen zoals kankercellen en minder sterk op gezonde cellen. Mitomycine wordt rechtstreeks in de blaas toegediend.

Hoeveel blaasspoelingen zijn nodig?

De blaasspoelingen kunnen op diverse momenten gegeven worden:

- Binnen 24 uur na de TUR operatie (hier gaat deze app over)
- Vierwekelijkse spoelingen, gevolgd door zeven spoelingen eenmaal per week

Over blaasspoeling met mitomycine op de dagbehandeling is een app; Blaasspoelingen met mitomycine (dagbehandeling) beschikbaar.

De blaasspoelingen

Hoe verloopt de blaasspoeling?

De blaasspoeling wordt binnen 24 uur na de TURT operatie op de verpleegafdeling gegeven.

Meer informatie over: Hoe verloopt de blaasspoeling?

De uroloog beslist tijdens de operatie of u de mitomycine spoeling moet krijgen. In enkele gevallen kan er na de operatie geen spoeling worden gegeven. Bijvoorbeeld als bij het wegschrappen van het tumorweefsel de blaaswand beschadigd is en door een gaatje (blaasperforatie) spoelvloeistof in de buik zou kunnen lopen.

De blaasspoeling wordt binnen 24 uur na de TURT operatie op de verpleegafdeling gegeven. De ruggenprik moet zijn uitgewerkt en de urine moet helder genoeg zijn. Als er te veel bloed bij de urine zit, kan de spoeling niet worden gegeven.

Tijdens de operatie heeft u een blaaskatheter gekregen. Door deze katheter wordt de spoeling ingebracht. Daarna wordt de katheter afgeklemd zodat de mitomycine in de blaas blijft zitten. Het is de bedoeling dat u probeert de blaasspoeling 2 uur in de blaas te houden.

Als u na het inbrengen van de spoeling pijnklachten krijgt in de blaasstreek of dringend moet plassen, dan kunt u de verpleegkundige waarschuwen. Zij kijkt of de mitomycine eventueel al eerder uit de blaas gehaald moet worden.

Na de blaasspoeling

Bekijk in dit onderdeel alles wat je moet weten nadat je de blaasspoeling hebt gekregen.

Meer informatie over: Na de blaasspoeling

- De urine kan een grijs-zwarte kleur hebben door de spoeling.
- Het is belangrijk dat u niet met uw handen in aanraking komt met de vloeistof. Bij huidcontacten kan u het beste de huid direct afwassen met water.
- U moet zittend plassen om spatten en verspreiden van de mitomycine te voorkomen.
- Spoel na het toiletgebruik twee maal door met het toiletdeksel naar beneden en was de handen met zeep.
- Maak dagelijks het toilet schoon met een ph-neutrale zeep (geen chloor of bleek).
- Reinig de geslachtsdelen zorgvuldig met veel water.
- Heb geen geslachtsgemeenschap gedurende 48 uur na toediening van de spoeling.
- Als er vloeistof op de kleding is gemorst dan kan deze gewoon in de wasmachine, u moet de kleding dan wel eerst spoelen met een koud wasprogramma.
- Drink veel om de vloeistof uit de blaas te spoelen (1,5- 2 liter per dag).

Bovenstaande maatregelen gelden voor 48 uur.

Bijwerkingen

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van de mitomycine spoeling lees je hier.

Meer informatie over: Bijwerkingen

- Mitomycine kan de werking van bloedverdunners beïnvloeden.
- Vrouwen mogen niet zwanger worden, anticonceptie moet tot minimaal drie maanden in de kuur worden gebruikt.
- In combinatie met andere medicijnen kan Mitomycine de werking van vaccins verminderen en kunnen er meer bijwerkingen ontstaan.
- U kunt na de spoeling enkele dagen daarna het gevoel hebben een blaasontsteking te hebben.
- Moeite met ophouden van de urine.
- Bloed en of weefseldeeltjes in de urine.

Klachten door de blaasspoeling



Wanneer moet u contact opnemen:

- **Als u zich in algemene zin niet lekker voelt.**
- **U koorts heeft boven de 38,5 graden en/ of rillerig bent.**
- **Veel bloed in de urine heeft.**

Als u een van deze klachten ervaart, neem dan contact op met de regieverpleegkundige of polikliniek urologie. Buiten kantooruren neemt u contact op met de huisartsenpost.

Controle

Controle

Om het effect van de behandeling te beoordelen, bekijkt de uroloog de binnenkant van de blaas (cystoscopie). De eerste cystoscopie krijgt u meestal drie maanden na de ingreep. Meer informatie over een cystoscopie vindt u in de app Cystoscopie.