

Brandwonden

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Inhoudsopgave	1
Soorten brandwonden	1
1^e graads brandwonden	1
2^e graads brandwonden	1
3^e graads brandwonden	1
Behandeling van brandwonden	2
Verzorgen van brandwonden thuis	2
Complicaties	2
Tot slot	2
Belangrijke telefoonnummers	2

U bent op de afdeling Spoedeisende Hulp van het ETZ behandeld voor brandwonden. De arts heeft u al uitleg gegeven. In deze brochure kunt u alles nog eens nalezen.

Soorten brandwonden

Een brandwond is een wond die meestal ontstaat door verbranding van de huid door invloed van hitte gedurende een bepaalde tijd boven de 42°C.

Brandwonden worden, afhankelijk van de diepte, in gradaties onderverdeeld. De diepte en daarmee de graad van een brandwond, hangt af van de temperatuur, de tijd dat de huid blootgesteld wordt aan die temperatuur en de oorzaak.

1^e graads brandwonden

Bij 1^e graads brandwonden is de bovenste huidlaag (de opperhuid) niet beschadigd. De huid is rood, droog, pijnlijk en soms gezwollen. Een voorbeeld van een 1^e graadsverbranding is zonnebrand van de huid.

2^e graads brandwonden

Oppervlakkige 2^e graads brandwond:

de huid is beschadigd, rood, nat en pijnlijk. Er is sprake van blaarvorming.

Diepe 2^e graads brandwond:

de huid is zichtbaar beschadigd. De hitte heeft langer kunnen doordringen in de huid en er is duidelijk sprake van een wond. De wond is roodachtig-wit, nat en zeer pijnlijk. Er is sprake van blaarvorming, waarbij de huid vaak kapot is.

3^e graads brandwonden

Bij een 3^e graads brandwond is de wond wit of zwart, droog en leerachtig. De wond is nauwelijks pijnlijk, omdat de zenuwen in de huid ook zijn aangetast. 3^e graads brandwonden komen meestal voor in combinatie met 2^e en 1^e graads brandwonden.

Behandeling van brandwonden

Voor **alle** brandwonden geldt het advies om eerst minimaal 10 minuten te koelen onder **lauw** stromend water. Als pijnstilling kunt u paracetamol 500mg nemen.

1^e graads brandwonden worden behandeld met een crème, zoals after sun of Vaseline[®].

2^e en 3^e graads brandwonden worden behandeld met Flammazine[®] of Flammacerium[®]. Beide zijn anti-bacteriële middelen die ervoor zorgen dat de brandwond niet gaat ontsteken.

Verzorgen van brandwonden thuis

Diepe 2^e graads brandwonden en 3^e graads brandwonden moeten iedere dag verschoond worden. De oude zalf spoelt u af onder lauw water, daarna brengt u een nieuw laag zalf aan op de wond en verbindt deze.

Als de wond genezen is, kunt u het litteken het beste vet houden. Dit doet u door er crème op te smeren, waardoor het soepel blijft. Vermijdt het eerste jaar na de verbranding zon op het litteken. Komt u toch in de zon, smeet het litteken dan in met een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor.

Als de brandwond in de buurt van een gewricht zit, moet u dit gewricht zo snel mogelijk weer gaan bewegen om stijf worden te voorkomen.

Complicaties

Als u koorts (boven 38,0°C) krijgt of als de wond warm en rood is, kan dit op een ontsteking wijzen. U moet dan contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

In geval van ernstige brandwonden kunnen door de vorming van littekenweefsel contracturen ontstaan. Dit zijn samentrekkingen van weefsel waardoor gewrichten verkrommen.

Tot slot

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen hebt, kunt u deze stellen aan de verpleegkundige van de afdeling Spoedeisende Hulp.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Spoedeisende Hulp (013) 221 80 10

Locatie ETZ Elisabeth
Route 53

Spoedeisende Hulp, 43.666 01-19

Copyright[®] ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.