

# Capsulectomie

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

## Welkom

---

### Welkom!



Welkom in deze app. U kunt hier meer informatie vinden over Capsulectomie.

### Gebruikt u MijnETZ al?



Hiermee kunt u veilig digitaal meekijken in uw eigen patiëntendossier.

### Ons team



Uw behandeling wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg. Via onderstaande link kunt u alle plastisch chirurgen zien werkzaam in het ETZ.

## Algemene informatie

---

### Algemene informatie



Kapselvorming, in medische termen capsulectomie, is een op zichzelf normaal verschijnsel na een borstvergroting. Soms treedt overmatige kapselvorming op.

## Wat is kapselvorming?

---

### Wat is kapselvorming?

De protheses ziet het lichaam als lichaamsvreemd materiaal. Na het inbrengen van de prothese wordt deze daarom omringd door een vliedun laagje littekenachtig bindweefsel dat door het lichaam wordt aangemaakt. Dat wordt kapsel genoemd en is een natuurlijke reactie van het lichaam.

### Meer informatie over: Wat is kapselvorming?

Kapselvorming na een borstvergroting is nuttig en heeft een functie. De kapselvorming zorgt ervoor dat de

prothese goed gaat hechten aan het omringende weefsel zodat deze daarna niet meer kan uitzakken, draaien of anderszins kan verplaatsen. Het inkapselen van de prothese vindt plaats gedurende ongeveer zes weken na de borstvergroting.

Als tijdens inkapselingsfase de weefsels rondom deze prothese te veel bewegen ten opzichte van de prothese, kan de gewenste inkapseling niet (goed) plaatsvinden. De prothese kan dan gaan verplaatsen.

## Overmatige kapselvorming

---

### Overmatige kapselvorming

**Kapselvorming is dus een normaal verschijnsel en het heeft een belangrijke functie. Maar bij een aantal patiënten die een borstvergroting heeft ondergaan, is sprake van overmatige kapselvorming.**

#### Meer informatie over: Overmatige kapselvorming

Het lichaam gaat dan langer door met het maken van het kapsel. Het kapsel wordt dan te dik en gaat bovendien samentrekken. Dat wordt kapselcontractie of ook wel kapselfibrose genoemd.

Door het samentrekken wordt de prothese ingeklemd, wordt deze harder en kan ook gaan vervormen. De prothese wordt hierdoor voelbaar en soms ook zichtbaar. In bepaalde gevallen treedt ook pijn op.

Als overmatige kapselvorming optreedt, dan is dat meestal binnen drie maanden tot een jaar na de operatie. Daarna wordt de kans op overmatige kapselvorming veel kleiner maar incidenteel kan het ook pas na vijf jaar voorkomen.

## Wanneer treedt overmatige kapselvorming op?

---

### Wanneer treedt overmatige kapselvorming op?

**Of overmatige kapselvorming gaat optreden, is vooraf niet te voorspellen. Zelfs bij één vrouw kan er wat dat betreft een verschil zijn tussen de linker- en de rechterborst. Wel is van een aantal factoren bekend dat zij de kans op overmatige kapselvorming beïnvloeden.**

#### Meer informatie over: Wanneer treedt overmatige kapselvorming op?

Een factor die invloed heeft op de kapselvorming is de mate waarin bloedingen tijdens of na de ingreep optreden. Bij een nabloeding worden de poriën van de prothese gevuld met bloedstolsels waardoor ook een geruwde prothese de eigenschappen gaat krijgen van een gladde prothese die een veel grotere kans op overmatige kapselvorming kent. Bij een borstvergroting waarbij de incisie gemaakt wordt in de borstplooi bestaat de kleinste kans op (na)bloedingen. De chirurg heeft dan een beter zicht op de pocket (de ruimte waarin de prothese geplaatst wordt) en kan met meer precisie werken.

Tot slot wordt vermoed dat ook het optreden van (kleine) infecties als gevolg van de borstvergroting de kapselvorming daarna kan stimuleren.

## De operatie

---

### De operatie



**Overmatige kapselvorming komt in verschillende gradaties voor. Het kan gaan om een lichte en niet hinderlijke vorm (graad 1) tot een ernstige vorm met verhoogde gevoeligheid en een zichtbaar harder geworden kapsel (graad 4).**

### **Meer informatie over: De behandeling**

#### **Capsulectomie**

Bij een ernstige mate van kapselvorming kan besloten worden om dit kapsel volledig te verwijderen. Uiteraard is dat een meer ingrijpende hersteloperatie. Deze ingreep wordt een capsulectomie genoemd. Als een capsulectomie uitgevoerd moet worden, dan vindt meestal ook een prothesewissel plaats, afhankelijk van hoe lang de protheses al aanwezig zijn.

## **Vergoeding**

---

### **Vergoeding**



**Wat belangrijk is om te weten, is dat het opnieuw vergroten van de borst en dus ook de nieuwe protheses niet vergoed worden door de ziektekostenverzekeraar.**

### **Meer informatie over: Vergoeding**

De capsulectomie vraagt de plastisch chirurg aan bij de zorgverzekering. Als de zorgverzekering de ingreep vergoedt, dan moet u het opnieuw vergroten van de borst en de nieuwe protheses dus toch zelf bekostigen. Binnen zes weken krijgt u antwoord van uw zorgverzekering.

### **Aanvraag voor een operatie bij de zorgverzekeraar**



**Onze plastisch chirurg heeft voor u een aanvraag gedaan bij de zorgverzekeraar voor de vergoeding van een operatie. Hier leest u wat u daarvan kan verwachten.**

### **Meer informatie over: Aanvraag voor een operatie bij de zorgverzekeraar**

Het duurt gemiddeld drie weken voordat de zorgverzekeraar uw aanvraag verwerkt heeft en u hierover thuis bericht ontvangt.

### **Bij een goedkeuring**

Wij adviseren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het kan namelijk zijn dat het vergoed wordt tot een maximum bedrag. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de aanvullende verzekering die u mogelijk heeft. Als duidelijk is wat er vergoed wordt, kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie voor het inplannen van de ingreep.

### **Bij een afwijzing**

U kunt het volgende doen.

1. Afzien van de behandeling.
2. In beroep gaan bij uw verzekeraar.

U schrijft een bezwaarbrief waarin u aangeeft dat u het niet eens bent met de afwijzing en dat u een herbeoordeling wenst. Als u wilt, kunt u vragen of ze u willen oproepen op het spreekuur van de verzekeringsarts. De brief stuurt u naar de medisch adviseur.

### **Bij vragen over de machtiging**

Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van de plastische chirurgie. Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur.

### **Bij een goedkeuring machtiging**

Zodra u een goedkeuring heeft kan de operatie worden gepland, hiervoor kunt u contact opnemen met de OK planners van de plastische chirurgie.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

## **Complicaties**

---

### **Complicaties**

**Op de resultaten of op een ongestoord verloop van de operatie en de genezing kan geen garantie gegeven worden. Er kunnen altijd complicaties optreden.**

**Denk aan:**

- **Problemen met de narcose**
- **Infectie**
- **Nabloeding**

## **Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?**

---

### **Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?**



**In de volgende gevallen moet u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie om een nieuwe afspraak te maken:**

- **Nabloeding**
- **Ontstekingen (rood, dik of gezwollen)**
- **Toenemende of blijvende pijn**

**In dringende gevallen buiten kantooruren en in het weekend, kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost.**

## **Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?**

---

### **Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?**



**Als u door ziekte of een andere reden niet naar uw afspraak kunt komen, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden.**