

# Dagbehandeling met geneesmiddel provocatie

De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te nemen:



- 1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of scan de QR code.
- 2 Download de app
- 3 Accepteer de push notificaties
- 4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
- 5 Selecteer de juiste behandeling en druk op 'Start'.

## Welkom

---

### Geneesmiddelen provocatietest

**Tijdens het gebruik van geneesmiddelen kunnen klachten optreden vanwege overgevoeligheid. Een manier om dit te testen is een geneesmiddel provocatietest te doen. Aan de hand van de uitslag kan de arts besluiten of het geneesmiddel gestopt moet worden, of dat het een volgende keer gebruikt mag worden.**

## Vorbereiding

---

### Medicatie



**Om de test goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat u met de inname van een antiallergisch medicijn ten minste 4 dagen voor de test stopt.**

### Meer informatie over: Medicatie

Om de test goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u met de inname van een antiallergisch medicijn tenminste 4 dagen voor de test stopt. Het is belangrijk dat u uw actuele medicatielijst of doosjes van uw medicijnen meeneemt naar de test. Gebruikt u Bètablokkers of antidepressiva? Klik dan op de onderstaande button voor belangrijke informatie.

## Antidepressiva

Een aantal antidepressiva kunnen een remmende werking hebben op de test. Als u antidepressiva gebruikt moet u vooraf dit aan de allergoloog doorgeven. U mag nooit zonder overleg stoppen met deze medicatie.

## Anti-allergische medicatie



Zie afbeelding voor een overzicht van anti-allergische medicatie.

## Bètablokkers



Gebruikt u/uw kind Bètablokkers tabletten (voorgeschreven voor onder andere hartaandoeningen, hoge bloeddruk of migraine) of Bètablokkers oogdruppels (voorgeschreven voor hoge oogbaldruk) en heeft u dit nog niet besproken met uw behandelend Allergoloog? Dan moet u voor de test contact opnemen met het Allergiecentrum. Deze middelen kunnen namelijk allergische reacties versterken en vormen daarom een risico op eventuele gevaarlijke reacties. De noodzaak van de test wordt heroverwogen en er wordt eventueel overlegd met uw behandelend arts of met de inname van deze medicatie tijdelijk gestopt kan worden (Nb. niet stoppen zonder overleg).

## Goed om te weten!

**Op de dagbehandeling staan luxe verstelbare stoelen, er is ruimte voor maximaal vijf patiënten.**

**De test duurt ongeveer tot halverwege de middag. Neem eventueel een goed boek, laptop (er is WiFi) of ander tijdverdrijf mee.**

### Meer informatie over: Goed om te weten!

De provocatie duurt ongeveer tot halverwege de middag. Neem eventueel een goed boek, laptop (er is WiFi) of ander tijdverdrijf mee. Het is niet de bedoeling dat degene die u brengt bij de test aanwezig blijft. Uiteraard mogen ouders en begeleiders wel bij de test aanwezig blijven.

Als u zwanger bent, of wanneer de conditie van u/uw kind is verslechterd (bijvoorbeeld koorts, kortademigheid of hartklachten) raden wij u aan van te voren contact op te nemen met ons om te beoordelen of de provocatie door kan gaan.

Het is niet nodig om nuchter te komen voor de provocatie (het wordt aanbevolen juist wel te ontbijten, tijdens de test moet u een aantal uren nuchter blijven). Let op: Er mag geen lunch met sterke allergenen zoals pinda, noot, ei of vis worden meegebracht.

## Meenemen naar provocatietest

- Actuele medicijnlijst of doosjes van medicijnen
- Tijdverdrijf, zoals boek of laptop. Op de kinderafdeling is speelgoed aanwezig.
- Als u een specifiek dieet hebt, kunt u het beste zelf iets meenemen. Er mogen geen sterke allergenen zoals pinda, noot, ei of vis meegebracht worden.

## De provocatietest

---

### Waar mag u zich melden?



Volwassenen worden verwacht op locatie ETZ Elisabeth op het Allergiecentrum Dagbehandeling (route 35). U moet zich daar op de afgesproken tijd melden.

Kinderen worden verwacht op locatie ETZ Elisabeth op de Dagbehandeling van de kinderafdeling FAM (route 80). U kunt zich daar melden op de afgesproken tijd. Deze afdeling is speciaal ingericht voor de opvang van kinderen.

### Vorbereiding door zorgprofessional



De verpleegkundige meet uw bloeddruk en pols en prikt een infuus. Het infuus wordt geprikt om bij een eventuele allergische reactie medicatie te kunnen toedienen. Daarna stelt de arts u enkele vragen en verricht hij/zij een kort lichamelijk onderzoek. Bij kinderen die op de kinderafdeling komen wordt er alleen een infuus geprikt indien nodig, de arts spreekt dit af.

### Verloop provocatietest

De provocatie begint meestal met een kleine hoeveelheid van het betreffende geneesmiddel. Als dit goed wordt verdragen, krijgt u na een tijd een hogere dosering. Zo wordt telkens een grotere dosis gegeven tot uiteindelijk een normale dosering is bereikt. Soms wordt de dosering in één keer gegeven.

### Belangrijke informatie gedurende de provocatietest

Het is belangrijk dat u tijdens de provocatietest:

- op de dagbehandeling blijft
- indien u klachten krijgt, dit direct meldt aan de arts of verpleegkundige;
- het toilet bezoekt in overleg
- tussendoor niets eet of drinkt (water, koffie en thee mag wel).

### Meer informatie over: Belangrijke informatie gedurende de provocatietests

Tussen deze verschillende stappen kunt u iets voor u zelf doen. Belangrijk is wel dat u:

- Op de dagbehandeling blijft (naar buiten om bijvoorbeeld te roken is niet toegestaan);
- Indien u klachten krijgt, dit meldt aan de arts of verpleegkundige;
- Het toilet bezoekt in overleg (liefst net voor een volgende stap, u mag de deur niet op slot doen);
- Tussendoor niets eet of drinkt (water, koffie en thee mag wel).

Omdat voeding de opname van medicijnen in de maag kan vertragen, mag er tijdens de test niet of

beperkt gegeten worden. De arts geeft aan vanaf welk moment u wel mag eten. Voor eten en drinken wordt gezorgd (als u een specifiek dieet hebt, kunt u het beste zelf iets meenemen).

## Klachten provocatietest

**Na de laatste dosering wordt u nog een tijdje geobserveerd. Indien er geen klachten zijn, wordt het infuus verwijderd en kunt u weer naar huis.**

### Meer informatie over: Klachten

Na de laatste dosering wordt u nog een tijdje geobserveerd. Indien er geen klachten zijn kunt u weer naar huis. In zeldzame gevallen komt de reactie alsnog later. U dient deze verschijnselen zorgvuldig te noteren. Bij onverwachte en/of huidreacties raden wij u aan telefonisch contact met het Allergiecentrum op te nemen. Mocht het Allergiecentrum niet bereikbaar zijn, dan kunt u bellen met het algemene nummer van het ziekenhuis voor telefonisch overleg met een allergoloog of de Spoedeisende Hulp.

## Uitslag

---

### Uitslag

**Tijdens de volgende afspraak bespreekt de allergoloog met u de uitslag. Hij/zij geeft toelichting op de resultaten van het onderzoek en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor u of uw kind.**

## Contact

---

### Contact



**Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Allergiecentrum.**

**Heeft u een ernstige allergische reactie na 17:00 uur, neem dan contact op met huisarts of huisartsenpost.**

### Meer informatie over: Contact

#### **ETZ Elisabeth**

#### **Direct nummer**

(013) 221 00 20

#### **Openingstijden**

ma t/m vrij 8.30-17.00

#### **Route**

35

## Antiallergische medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het heel belangrijk dat u/uw kind de inname van de volgende medicijnen 4 dagen voor de test stopt:

### Tabletten

Algemene naam	Merksnaam
Acrivastine	Semprex <sup>o</sup>
Alimemazine	Nedeltran <sup>o</sup>
Cetirizine	Zyrtec <sup>o</sup> , Reactine <sup>o</sup> , Revalintabs <sup>o</sup>
Chloorcyclizine/cinnarizine	Primatour <sup>o</sup>
Cimetidine	Tagamet <sup>o</sup>
Cinnarizine	
Clemastine	Tavegil <sup>o</sup>
Cromoglicinezuur	Nalcrom <sup>o</sup>
Cyclizine	
Cyproheptadine	Periactin <sup>o</sup>
Desloratadine	Aerius <sup>o</sup>
Dexchlorfeniramine	Polaramine <sup>o</sup>
Dimenhydrinaat	
Dimetindeen	Fenistil <sup>o</sup>
Ebastine	Kestine <sup>o</sup>
Famotidine	Pepcid <sup>o</sup> , Pepcidin <sup>o</sup>
Fexofenadine	
Guaifenesine/natrium-benzoaat/oxomemazine	Toplexil <sup>o</sup>
Hydroxyzine	Atarax <sup>o</sup>
Ketotifen	Zaditen <sup>o</sup>
Levocetirizine	Xyzal <sup>o</sup>
Loratadine	Allerfre <sup>o</sup> , Claritine <sup>o</sup>
Mebhydroline	
Meclozine	Suprimal <sup>o</sup>
Meclozine/pyridoxine	Emesafene <sup>o</sup>
Mizolastine	Mizollen <sup>o</sup>
Montelukast	Singulair <sup>o</sup>
Nizatidine	Axid <sup>o</sup>
Oxatomide	Tinset <sup>o</sup>
Oxomemazine	Toplexil <sup>o</sup>
Promethazine	
Ranitidine	Zantac <sup>o</sup>
Ranitidinebismutcitraat	Pylorid <sup>o</sup>
Terfenadine	Triludan <sup>o</sup>

Zie afbeelding voor een overzicht van anti-allergische medicatie.

### Bètablokkers

## Bètablokkers

Indien u/uw kind zogenaamde Bètablokkers tabletten/oogdruppels gebruikt, dient u vooraf contact met de polikliniek Allergologie op te nemen.

### Tabletten

Algemene naam	Merksnaam
Acebutolol	Sectral <sup>°</sup>
Atenolol	Tenormin <sup>°</sup>
Atenolol/chloortalidon	Tenoretic <sup>°</sup>
Atenolol/nifedipine	Niften <sup>°</sup>
Betaxolol	Kerlon <sup>°</sup>
Bisoprolol	Emcor <sup>°</sup>
Bisoprolol/hydrochloorthiazide	Emcoretic <sup>°</sup>
Carvedilol	Eucardic <sup>°</sup>
Celiprolol	Dilanorm <sup>°</sup>
Esmolol	Brevibloc <sup>°</sup>
Labetalol	Trandate <sup>°</sup>
Metoprolol	Lopresor <sup>°</sup> , Selokeen <sup>°</sup>
Metoprolol/hydrochloorthiazide	Selokomb <sup>°</sup>
Nebivolol	Nebilet <sup>°</sup>
Oxprenolol	
Pindolol	Viskeen <sup>°</sup>
Propranolol	Inderal <sup>°</sup>
Sotalol	Sotacor <sup>°</sup>

### Oogdruppels

Algemene naam:	Merksnaam
Betaxolol	Betoptic <sup>°</sup>
Bimatoprost/timolol	Ganfort <sup>°</sup>
Brimonidine/timolol	Combigan <sup>°</sup>
Carteolol	Teoptic <sup>°</sup> , Arteoptic <sup>°</sup> , Carteabak <sup>°</sup>
Dorzolamide/timolol	Cosopt <sup>°</sup>
Latanoprost/timolol	Xalacom <sup>°</sup>
Levobunolol	Betagan liquifilm <sup>°</sup>
Metipranolol	Beta Ophtiole <sup>°</sup> (EDO)
Metipranolol/pilocarpine	Normoglaucan <sup>°</sup>
Pilocarpine/timolol	Timpilo <sup>°</sup>
Timolol	Loptomit <sup>°</sup> , Nyogel <sup>°</sup> , Timo-COMOD <sup>°</sup> , Timoptol <sup>°</sup>
Travoprost/timolol	Duotran <sup>°</sup>

Gebruikt u/uw kind Bètablokkers tabletten (voorgeschreven voor onder andere hartaandoeningen, hoge bloeddruk of migraine) of Bètablokkers oogdruppels (voorgeschreven voor hoge oogboldruk) en heeft u dit nog niet besproken met uw behandelend Allergoloog? Dan moet u voor de test contact opnemen met het Allergiecentrum. Deze middelen kunnen namelijk allergische reacties versterken en vormen daarom een risico op eventuele gevaarlijke reacties. De noodzaak van de test wordt heroverwogen en er wordt eventueel overlegd met uw behandelend arts of met de inname van deze medicatie tijdelijk gestopt kan worden (Nb. niet stoppen zonder overleg).

## Belangrijke informatie gedurende de provocatietets

---

Tussen deze verschillende stappen kunt u iets voor u zelf doen. Belangrijk is wel dat u:

- Op de dagbehandeling blijft (naar buiten om bijvoorbeeld te roken is niet toegestaan);
- Indien u klachten krijgt, dit meldt aan de arts of verpleegkundige;
- Het toilet bezoekt in overleg (liefst net voor een volgende stap, u mag de deur niet op slot doen);
- Tussendoor niets eet of drinkt (water, koffie en thee mag wel).

Omdat voeding de opname van medicijnen in de maag kan vertragen, mag er tijdens de test niet of beperkt gegeten worden. De arts geeft aan vanaf welk moment u wel mag eten. Voor eten en drinken wordt gezorgd (als u een specifiek dieet hebt, kunt u het beste zelf iets meenemen).

### Contactgegevens

---

**Allergiecentrum** 013-2210020

**Website** <https://www.etz.nl/Specialisme/Allergiecentrum>