

Dubbelballon - Scopie Oraal

De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te nemen:



- 1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of scan de QR code.
- 2 Download de app
- 3 Accepteer de push notificaties
- 4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
- 5 Selecteer de juiste behandeling en druk op 'Start'.

Welkom

Welkom

Binnenkort wordt u op de endoscopie-afdeling verwacht voor een dubbelballon-scopie. In deze app vindt u alle informatie over het onderzoek en de bijhorende voorbereiding

Meer informatie over: ETZ

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners in de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.

Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. We gaan met patiënten in gesprek over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren we onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

Wat is een Dubbelballon scopie

Dubbelballon-scopie

Een dubbelballon-scopie is een onderzoek van de dunne darm. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een endoscoop.

Meer informatie over: dubbelballon- scopie

Dat is een soepele slang met aan het einde een kijker en een lampje. Met behulp van twee ballonnetjes kan de endoscoop verder in de dunne darm komen dan een standaard endoscoop. Het is voor de maag-

darm-leverarts mogelijk om in uw dunne darm te kijken en eventuele afwijkingen op te sporen of uit te sluiten. In veel gevallen is het mogelijk meteen te behandelen. Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.

Complicaties

Slechts in zeldzame gevallen treden door het onderzoek complicaties op. Zo is er een heel klein risico op een perforatie (gaatje in de maag of dunne darm), een bloeding of problemen met hart en longen.

Meer informatie over: complicaties

Dit risico op deze complicaties is bijzonder klein bij een gewone scopie en iets verhoogd na ingrepen, zoals het verwijderen van poliepen of het behandelen van bloedingen. Is bij u sprake van een complicatie, dan maakt dit verdere medische behandeling en soms zelfs een operatie noodzakelijk. Een andere zeldzame complicatie is een luchtweginfectie of longontsteking. Dit kan ontstaan als u zich verslikt en er maaginhoud in uw luchtwegen terecht komt.

Als er thuis sprake is van aanhoudend of fors bloedverlies, hevige buikpijn of koorts, neem dan contact op met Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten. Als dit buiten kantoortijd is, kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp van locatie ETZ Elisabeth.

Vorbereiding

Medicatie

In de voorbereiding voor het onderzoek zijn er mogelijk aanpassingen nodig in uw medicijngebruik.

Hieronder leest u wat u eventueel dient aan te passen.

Ijzerpreparaten

Als u ijzerpreparaten gebruikt, moet u met de inname zeven dagen voor het onderzoek stoppen. Na het onderzoek kunt u de de ijzerpreparaten weer innemen.

Colofort

U heeft een recept gekregen voor laxeerdrank (Colofort®) óf dit recept is digitaal verstuurd naar uw apotheek. U kunt dit medicijn ophalen bij de apotheek. Wacht hiermee niet tot het laatste moment, het kan namelijk zijn dat het middel niet op voorraad is. Wij vragen u de laxeerdrank te gebruiken volgens de instructies in deze app. Dus niet volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de apotheek!

Verder

- Wij adviseren u ruim zittende kleding te dragen, dus geen korset, step-in of stropdas.
- Voor het onderzoek moet u uw gebitsprothese uitdoen.
- Wij verzoeken u geen lippenstift op te doen; dit is namelijk erg moeilijk van de endoscoop te verwijderen.

Onderzoek in de ochtend

Onderzoek in de ochtend

Dag voor het onderzoek:

- Na 's middags 17.00 uur mag u niets meer eten tot het onderzoek.
- Heldere dranken als water, thee of (gezeefde) bouillon zijn wel toegestaan.
- U maakt de laxeerdrank klaar: u voegt aan de inhoud van één zakje Colofort® één liter kraanwater toe.
- Tussen 19.00 en 21.00 uur drinkt u 1 liter laxeerdrank. U kunt beter niet binnen één uur de laxeerdrank drinken, neem daarvoor gerust 1,5 à 2 uur de tijd.
- Hierna drinkt u nog minimaal een halve liter heldere dranken.
- U mag na 24.00 uur ook niets meer drinken en roken tot na het onderzoek. Dit omdat u voor dit onderzoek nuchter moet zijn.

Onderzoek in de middag

Onderzoek in de middag

Dag van het onderzoek:

- U neemt geen ontbijt
- U maakt de laxeerdrank klaar: u voegt aan de inhoud van één zakje Colofort® één liter kraanwater toe.
- Tussen 07.00 en 09.00 uur drinkt u 1 liter laxeerdrank. U kunt beter niet binnen één uur de laxeerdrank drinken, neem daarvoor gerust 1,5 à 2 uur de tijd.
- Hierna drinkt u nog een halve liter heldere dranken.
- Na 10.00 uur mag u ook niets meer drinken. Vanaf die tijd moet u nuchter blijven.

Het onderzoek

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd. Kijk goed op welke locatie het onderzoek plaatsvindt! De locatie en route kunt u vinden in de afspraakbrief en in Mijn ETZ (als u hiervoor een account hebt)

Voor beide locaties meldt u zich aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van het ziekenhuis. Daarna kunt u in de wachtkamer van de afdeling Endoscopie plaatsnemen.

- Voor locatie ETZ Elisabeth op de afdeling Endoscopie (Etage F)
- Voor locatie ETZ TweeSteden op de afdeling Endoscopie (route 59).

Voor het onderzoek

De verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de voorbereidingsruimte. Hij of zij neemt enkele vragen met u door, meet controles en prikt een infuusnaald. U wordt verzocht uw eventuele gebitsprothese uit te doen.

Het onderzoek zelf

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij op de onderzoekstafel. U krijgt een keelspray toegediend die de keel verdooft.

Meer informatie over: Het onderzoek zelf

Daarna krijgt u een plastic bijtring tussen de tanden/kaken ter bescherming van uw tanden en de endoscoop. U krijgt het rustgevend middel toegediend via het infuusnaaldje. De maag-darm-leverarts brengt de endoscoop in via uw mond. Daarbij wordt u gevraagd te slikken. Dit slikken kan een vervelend gevoel geven. U kunt gewoon doorademen door de neus en de mond. Gedurende het onderzoek wordt via de endoscoop af en toe een beetje CO₂/lucht ingeblazen om het slijmvlies beter te bekijken. Het kan zijn dat u hierdoor wat moet opboeren. Het kan nodig zijn dat er wat slijm wordt afgezogen. Dit afzuigen gebeurt via de scoop of via een extra zuigslangetje. Ook kunnen kleine stukjes weefsel (biopten) worden weggenomen voor onderzoek onder de microscoop. Dit is volkomen pijnloos, maar kan een trekkend gevoel geven.

De uitslag

De uitslag ontvangt u van uw behandelend arts op de polikliniek of telefonisch. U krijgt hiervoor een vervolgspraak. Soms kan de maag-darm-leverarts die het onderzoek verricht u al een voorlopige uitslag geven. Als tijdens het onderzoek weefsel weggenomen is, duurt het ruim een week voordat de uitslag bekend is

Na het onderzoek

Na het onderzoek blijft u op de afdeling uitslapen tot u goed wakker bent. Meestal duurt dit 30 minuten tot een uur. U kunt daarna weer gewoon eten en drinken. U kunt eten meenemen en direct na het onderzoek opeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Daarna moet u worden opgehaald op de endoscopieafdeling om onder begeleiding naar huis te worden gebracht. U kunt nog last hebben van darmkrampen en/of gering anaal bloedverlies.

Meer informatie over sedatie vindt u in de folder sedatie bij endoscopisch onderzoek.

Bij vragen

Als ik vragen heb?

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met de MDL-arts of de verpleegkundig specialist.

Alle informatie

ETZ

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners in de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.

Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. We gaan met patiënten in gesprek over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren we onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

complicaties

Dit risico op deze complicaties is bijzonder klein bij een gewone scopie en iets verhoogd na ingrepen, zoals het verwijderen van poliepen of het behandelen van bloedingen. Is bij u sprake van een complicatie, dan maakt dit verdere medische behandeling en soms zelfs een operatie noodzakelijk. Een andere zeldzame complicatie is een luchtweginfectie of longontsteking. Dit kan ontstaan als u zich verslikt en er maaginhoud in uw luchtwegen terecht komt.

Als er thuis sprake is van aanhoudend of fors bloedverlies, hevige buikpijn of koorts, neem dan contact op met Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten. Als dit buiten kantoor tijd is, kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp van locatie ETZ Elisabeth.

dubbelballon- scopie

Dat is een soepele slang met aan het einde een kijker en een lampje. Met behulp van twee ballonnetjes kan de endoscoop verder in de dunne darm komen dan een standaard endoscoop. Het is voor de maag-darm-leverarts mogelijk om in uw dunne darm te kijken en eventuele afwijkingen op te sporen of uit te sluiten. In veel gevallen is het mogelijk meteen te behandelen. Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.

Het onderzoek zelf

Daarna krijgt u een plastic bijtring tussen de tanden/kaken ter bescherming van uw tanden en de endoscoop. U krijgt het rustgevende middel toegediend via het infuusnaaldje. De maag-darm-leverarts brengt de endoscoop in via uw mond. Daarbij wordt u gevraagd te slikken. Dit slikken kan een vervelend gevoel geven. U kunt gewoon doorademen door de neus en de mond. Gedurende het onderzoek wordt via de endoscoop af en toe een beetje CO₂/lucht ingeblazen om het slijmvlies beter te bekijken. Het kan zijn dat u hierdoor wat moet opboeren. Het kan nodig zijn dat er wat slijm wordt afgezogen. Dit afzuigen gebeurt via de scoop of via een extra zuigslangetje. Ook kunnen kleine stukjes weefsel (biopten) worden weggenomen voor onderzoek onder de microscoop. Dit is volkomen pijnloos, maar kan een trekkend gevoel geven.

Contactgegevens

ETZ	013-2210000
Polikliniek MDL	013-2210200
Website	http://www.etz.nl/mdl

Versie 202206301253