

Endo-echografie

De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te nemen:



- 1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of scan de QR code.
- 2 Download de app
- 3 Accepteer de push notificaties
- 4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
- 5 Selecteer de juiste behandeling en druk op 'Start'.

Welkom

Welkom

Welkom in het ETZ. In deze app vindt u alle informatie over uw Endo-echografie.



Meer informatie over: ETZ

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners in de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.

Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. We gaan met patiënten in gesprek over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren we onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

Het onderzoek

Wat is een Endo-echografie

Binnenkort wordt u op de Afdeling Endoscopie verwacht voor een endo-echografie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een endo-echoscoop. Deze soepele slang heeft op het eind een kijker, een lampje en een echovoorziening.

Meer informatie over: Wat is een endo-echografie?

Hiermee is het voor de maag-darm-leverarts mogelijk in uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm te kijken. Ook kunnen via deze scoop met behulp van onhoorbare pijnloze geluidsgolven, inwendige organen en lymfeklieren zichtbaar worden gemaakt. Tijdens het onderzoek kan via het holle gedeelte van de scoop een naald worden opgevoerd om weefsel en/of weefselvocht af te nemen. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Waar meldt u zich

U meldt zich aan bij de aanmeldzuil. Daarna gaat u zitten in de wachtkamer van de endoscopie op etage F.

Hoe verloopt het onderzoek

De verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de voorbereidingsruimte. Daar wordt u gevraagd op een bed te gaan liggen. De verpleegkundige brengt dan een infuusnaaldje in. Via dit naaldje kan de arts die het onderzoek verricht u een rustgevend middel geven waarvan u slaperig wordt.

Meer informatie over: Hoe verloopt het onderzoek?

U wordt verzocht uw eventuele gebitsprothese uit te doen.

De verpleegkundige plaatst een clipje op de vinger waarmee het zuurstofgehalte en uw hartslag worden gemeten. U krijgt een bloeddrukband om uw arm, waarmee met regelmaat uw bloeddruk wordt gemeten. Daarnaast krijgt u een zuurstofbrilletje in de neus. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde op de onderzoekstafel. U krijgt een keelspray toegediend die de keel verdooft. Daarna krijgt u een plastic bijtring tussen de tanden/kaken ter bescherming van uw tanden en de endoscoop. U krijgt het rustgevende middel toegediend via het infuusnaaldje.

De maag-darm-leverarts brengt de endo-echoscoop in via uw mond. Daarbij wordt u gevraagd te slikken. Dit slikken kan een vervelend gevoel geven. U kunt gewoon doorademen door de neus en de mond. Het kan nodig zijn dat er een beetje slijm wordt afgezogen. Dit afzuigen gebeurt via de scoop of via een extra zuigslangetje. Ook kunnen kleine stukjes weefsel (biopten) worden weggenomen voor onderzoek onder de microscoop. Dit is volkomen pijnloos, maar kan een trekkend gevoel geven. Daarnaast kan er ook weefsel of vocht weggehaald worden via een holle naald (punctie). Hier voelt u vrijwel niets van.

Natuurlijk proberen wij u op het afgesproken tijdstip te helpen. Een enkele keer kan het helaas toch gebeuren dat u langer moet wachten, omdat een vorig onderzoek uitloopt of een spoedingreep plaatsvindt. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Na het onderzoek

Na het onderzoek blijft u op de afdeling (waar u zich gemeld heeft) uitslapen tot u goed wakker bent. Meestal duurt dit een uur tot anderhalf uur.

Meer informatie over: Na het onderzoek

Als de keelverdooving geheel is uitgewerkt, kunt u gewoon weer eten en drinken. U kunt eten meenemen om na het onderzoek op te eten. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Daarna **moet** u worden opgehaald **op de endoscopieafdeling** om onder begeleiding naar huis te worden gebracht. Indien nodig kan uw begeleider bij de ingang van het ziekenhuis een rolstoel meenemen.

Meer informatie over sedatie vindt u in de folder sedatie bij endoscopisch onderzoek.

De uitslag ontvangt u van uw behandelend arts op de polikliniek. U krijgt hiervoor een vervolgspraak. Soms kan de maag-darm-leverarts die het onderzoek verricht u al een voorlopige uitslag geven. Als tijdens het onderzoek weefsel weggenomen is, duurt het ruim een week voordat de uitslag bekend is.

Complicaties

Slechts in zeldzame gevallen treden door dit onderzoek complicaties op.

Meer informatie over: Complicaties

Er is een klein risico op een perforatie (gaatje in maag of darm), een bloeding of problemen met hart en longen. Het risico op deze complicaties is bijzonder klein bij een gewone scopie en iets verhoogd als er materiaal moet worden afgenomen (biopsie of punctie). Is bij u sprake van een complicatie, dan is verdere medische behandeling en soms zelfs een operatie noodzakelijk.

Een andere zeldzame complicatie is een luchtweginfectie of longontsteking. Dit kan ontstaan als u zich verslikt en er maaginhoud in uw luchtwegen terecht komt.

Als er thuis sprake is van aanhoudend of fors bloedverlies, hevige buikpijn of koorts, neem dan contact op met Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten. Buiten kantoor tijd kunt u bellen naar de Spoedeisende Hulp van locatie ETZ Elisabeth.

Vorbereiding

Welke voorbereiding is thuis nodig?

Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit houdt in:

Meer informatie over: Welke voorbereiding is thuis nodig?

- Tot 6 uur voor het onderzoek mag u een licht verteerbare maaltijd eten, dit bestaat uit één beschuitje, één cracker of één sneetje wit brood met jam en een kopje thee.
- Op de dag van het onderzoek dus geen zware maaltijden of ondoorzichtige dranken meer nuttigen.
- Tot 2 uur voor het onderzoek mag u nog heldere dranken gebruiken zoals thee, water of appelsap.
- U mag 24 uur voor het onderzoek niet roken.

Medicatie

Lees hieronder over extra aandachtspunten als u bloedverduunners gebruikt of diabetes heeft.

Meer informatie over: Medicatie

Als u medicijnen gebruikt die de bloedstolling beïnvloeden, zoals Fenprocoumarol (Marcoumar®), Acenocoumarol (Sintrom®), Acetylsalicylzuur (Aspirine®, Acetosal®, Ascal®) of Clopidogrel (Plavix®), moet u dit vooraf met uw behandelend arts bespreken. Het is mogelijk dat u enkele dagen voor het onderzoek met de inname van deze medicijnen moet stoppen.

Als u diabetes (suikerziekte) heeft, wordt op de polikliniek met u besproken hoe u op de dag van het onderzoek met uw medicatie moet omgaan. Uit voorzorg kunt u uw insuline/medicatie en iets te eten meebrengen. Als u nog andere medicijnen gebruikt, wordt op de polikliniek met u besproken hoe u hier mee moet omgaan.

Overige informatie

- **Draag ruim zittende kleding.**
- **Voor het onderzoek moet u uw gebitsprothese uitdoen.**
- **Doe geen lippenstift op; dit is erg moeilijk van de endoscoop te verwijderen.**
- **Dit onderzoek vindt in principe plaats onder sedatie (roesje).**

Tot slot

Ziekte en andere vragen

Neem zo snel mogelijk contact op met de polikliniek MDL als u door ziekte of om andere redenen niet naar uw afspraak kunt komen.

Als u vragen heeft, kunt u die vooraf aan het onderzoek stellen of tijdens kantooruren bellen naar polikliniek MDL.