

Ethanolablatie schildklier onder echogeleide

Uw behandelend arts heeft voor u een Ethanolablatie van de schildklier onder echogeleide aangevraagd. Bij deze behandeling wordt een cyste (een met vocht gevulde ruimte) in de schildklier verwijderd. Onder echogeleide betekent dat met behulp van een echografie de juiste plaats in de schildklier wordt bepaald. De informatie in deze folder is algemeen. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een echografie is een onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven de schildklier kan worden afgebeeld. De geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een zogeheten transducer (=echokop), die over uw huid wordt bewogen. De geluidsgolven weerkaatsen verschillen in dichtheid van het weefsel. Deze worden door de transducer opgevangen en vervolgens door een computer in beelden omgezet. De geluidsgolven zijn niet schadelijk. Ook wanneer u zwanger bent, kunt u een echografie laten maken.

Een radioloog verricht de punctie geassisteerd door een medisch assistent of laborant.

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie op Locatie ETZ Elisabeth, route 72. U wordt verzocht zich te melden aan de balie van de afdeling Radiologie.

Belangrijk om te weten vóór de behandeling

Vorbereiding

Voor deze behandeling hoeft u niet nuchter te zijn.

Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met de inname van bloedverdünnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de Trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat. Als u andere medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen.

Melden

Wij vinden het belangrijk dat u vooraf aan het onderzoek aan de assistente meldt als u overgevoelig bent voor bepaalde zaken. Als u andere medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen.

Kleding

Voor het onderzoek is het nodig dat hals bloot is en dat uw geen halssierraden draagt.

Doel van de behandeling

De radioloog prikt de cyste in uw schildklier aan zodat het vocht eruit kan lopen. Vervolgens wordt er ethanol (alcohol) in de ruimte gespoten. Dit heeft een etsende werking, waardoor de wanden aan de binnenzijde van de cyste aan elkaar zullen kleven. Het is de bedoeling dat de cyste daardoor zal verschrompelen en zich niet opnieuw met vocht zal vullen.

Hoe verloopt de behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel met het hoofd iets achterover. Met behulp van echografie bepaalt de radioloog de exacte plaats van de cyste in uw schildklier. Rondom de cyste spuit de radioloog vervolgens een verdovingsmiddel in, waardoor de behandeling minder pijnlijk is.

Bij de prikplek wordt de huid goed schoongemaakt en de prikplek wordt afgedekt met een steriele doek. De radioloog prikt vervolgens de cyste met een holle naald aan, zodat het vocht uit de cyste kan worden gehaald. Via dezelfde naald spuit de radioloog nu ethanol ("alcohol") terug. Tijdens de behandeling vraagt de radioloog u regelmatig om te praten. Zo kan de radioloog nagaan of u geen hinder van de behandeling ondervindt.

Na verwijdering van het ethanol zal ook de naald worden verwijderd en wordt de prikplek afgedekt met een pleister.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling moet u nog even 30 minuten blijven wachten in de wachtruimte. Na 30 minuten komt de assistente informeren hoe het met u gaat, als u geen klachten heeft mag u naar huis gaan. De pleister, die door de assistent op de punctieplaats is aangebracht, kunt u na een paar uur al verwijderen. Het is mogelijk dat u een bloeduitstorting krijgt na de behandeling. Dit is helaas niet te voorkomen. Wanneer de verdoving is uitgewerkt en er pijnklachten optreden, kunt u een paracetamol innemen (voor gebruik; zie bijsluiter)

Risico's, complicaties en bijwerkingen bij deze behandeling

Elke behandeling kent risico's, bijwerkingen en/of complicaties. Zoals bij elke prik kan er een bloeding optreden. Dit is zelden levensbedreigend. Complicaties zijn echter zeer zeldzaam. Als u gedurende de dagen na de punctie vragen of onverklaarbare pijnklachten heeft, kunt u contact op te nemen met de afdeling Radiologie.

Hoe komt u aan de uitslag?

De radioloog maakt een schriftelijk verslag van de echografie en de ethanolbehandeling, deze kunt u met uw aanvragend arts bespreken.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak voor de behandeling na te komen, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Radiologie.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling Radiologie. Aan het begin van de behandeling vertelt de radioloog u nog een keer wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Radiologie: (013) 221 03 70

Locatie ETZ Elisabeth, route 72