

# Infuus bij ijzertekort Ferinject<sup>®</sup> (ferricarboxymaltose<sup>®</sup>)

Uw behandelaar heeft een infuus met Ferinject<sup>®</sup> voorgeschreven. In deze folder leest u meer over dit medicijn.

## IJzertekort

Uw lichaam heeft ijzer nodig. IJzer zorgt voor een goede conditie, bevordert de concentratie en houdt uw huid, haar en nagels gezond. Ook versterkt het de afweer tegen ziektes. Door een ijzertekort kunt u klachten van vermoeidheid en kortademigheid ervaren. De rode bloedlichaampjes in het bloed gebruiken ijzer om zuurstof op te nemen. Zij vervoeren het door het hele lichaam. Uw lichaam maakt zelf geen ijzer aan, daarom moet u dagelijks voldoende ijzer met het voedsel binnen krijgen. Onder bepaalde omstandigheden krijgt u onvoldoende ijzer binnen via het voedsel of uw lichaam neemt onvoldoende ijzer op. Het lichaam gebruikt dan het ijzer dat in de lever en milt is opgeslagen. Als die voorraad op is, ontstaat er een ijzertekort.

## Wat is Ferinject<sup>®</sup>?

Ferinject<sup>®</sup> is een medicijn dat kan worden ingezet voor het behandelen van:

- Bloedarmoede
- IJzer tekort bij hartfalen

Het doel van de behandeling is het aanvullen van ijzervoorraden in het lichaam, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van klachten als vermoeidheid en kortademigheid.

Ferinject<sup>®</sup> krijgt u via een infuus, maximaal 1000 mg per toediening. Het heeft een bruine kleur. De behandeling zelf duurt 30 tot 60 minuten, waarna u nog 30 min ter observatie blijft. U hoeft hiervoor niet op bed te liggen, u kunt plaatsnemen in een comfortabele stoel. Voor de behandeling wordt een infuus in een arm ingebracht. Voor, tijdens en na de behandeling voert een verpleegkundige een aantal metingen uit, waaronder controle van uw bloeddruk, hartslag, zuurstofgehalte in het bloed en temperatuur.

## Vorbereiding op de behandeling

Voor de behandeling met Ferinject<sup>®</sup> hoeft u geen voorbereidingen te treffen. Wij adviseren wel dat iemand u begeleidt naar het ziekenhuis en terug.

## Na de behandeling

Als u na de behandeling geen klachten ervaart en de metingen goed zijn, kunt u naar huis.

## Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Ferinject<sup>®</sup> bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

- *Bijwerkingen die vaak (1-10%) kunnen optreden:* hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, reacties op de aanprikplaats van het infuus (zoals pijn, blauwe plek, irritatie).
- *Bijwerkingen die soms (0,1-1%) kunnen optreden:* jeuk of tintelingen, huiduitslag, lage bloeddruk, roodheid, vermoeidheid, obstipatie, diarree, smaakverlies, spierpijn/kramp, rugpijn, gewrichtspijn, koorts, rillingen, pijn op de borstkast, stijfheid, vochtophoping.
- *Bijwerkingen die zelden (0,01-1%) kunnen optreden:* kortademigheid, bleke gelaatskleur, vochtophoping in het gezicht (zwelling).

NB: Als een van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die hier niet is vermeld, raadpleeg dan uw behandelaar.

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

## Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00