

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.



Welkom

Inleiding

Welkom in de zorgapp van het ETZ. We gebruiken deze app om u zo goed mogelijk te informeren over de Frenulumplastiek.

Meer informatie over: Inleiding

U wordt binnenkort in het ETZ verwacht voor een Frenulumplastiek. Dit is een kleine ingreep waarbij het riempje van de voorhuid (voorhuidbandje), aan de bovenkant van de penis, losser wordt gemaakt. De ingreep gebeurt poliklinisch onder plaatselijke verdoving.

Behandelteam

Wie behandelt u? Maak kennis met uw behandelteam.

Meer informatie over: Behandelteam

Deze urologen zijn werkzaam in het ETZ:

- Dr. Wijsman (aandachtsgebied Oncologie en laparoscopie)
- Dr. Breeuwsma (aandachtsgebied Oncologie en kijkoperaties (laparoscopie) aan de nieren)
- Dr. Dubbelman (aandachtsgebied kinderurologie, functionele urologie, andrologie, vrouwen met incontinentie)
- Dr. van Roijen (aandachtsgebied fertiliteit en Brachytherapie, andrologie, met name andrologische microchirurgie, Steenchirurgie, Plaatsvervangend opleider urologie)
- Dr. Davits (aandachtsgebied endoscopische steenchirurgie en brachytherapie)
- Dr. Muller (minimaal invasieve urologie, Laparoscopie en robotchirurgie)

Frenulumplastiek

Vorbereiding

- U hoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn.
- Als u bloedverdunners gebruikt, bespreek dan met uw arts of u met inname enige tijd voor de ingreep moet stoppen.
- Het wordt afgeraden om na de ingreep zelf een auto te besturen, het is daarom verstandig vooraf vervoer naar huis te regelen.

De ingreep

De frenulumplastiek vindt poliklinisch onder plaatselijke verdoving plaats. Na desinfectie verdooft de uroloog de plaats van de ingreep met een dun naaldje. Er worden voor het wondje één of meerdere oplosbare hechtingen gebruikt. De ingreep duurt 15 minuten.

Na de ingreep

Lees alle stappen onder het Lees verder menu.

Meer informatie over: Na de ingreep

- Over het algemeen wordt een vet gaasje op het wondje gelegd, dit mag de volgende dag eraf. Als u, na uitwerking van de verdoving, nog een pijnlijk gevoel hebt, kunt u paracetamol innemen.
- De eerste dagen na de ingreep adviseren we een goed sluitende onderbroek te dragen.
- De volgende dag mag u weer douchen (baden is na 5 dagen weer mogelijk).
- Het is verstandig om het de rest van de dag rustig aan te doen. U kunt in het algemeen de volgende dag weer aan het werk gaan.
- Geadviseerd wordt om één week niet te sporten en/of te zwemmen. U mag voor 2 à 4 weken geen seks hebben.

Controle

Complicaties

- Complicaties beperken zich meestal tot de wond.
- Zelden treedt een nabloeding of infectie op.
- U moet uw arts waarschuwen als u koorts krijgt (boven 38.5°C).

Controle

Een controleafspraak is niet nodig. Tenzij uw klachten niet over zijn.

Ik kan niet komen naar de afspraak

Wat te doen bij ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of andere redenen niet naar uw afspraak kunt komen, neem dan contact op

met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden. Als u wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.