

Grieprik bij chemotherapie, immunotherapie of doelgerichte therapie

Wanneer u wordt behandeld met chemotherapie, immunotherapie of doelgerichte therapie, heeft u mogelijk tijdelijk een verlaagde weerstand. Een besmetting met het griepvirus is in dat geval extra belastend. Daarom adviseren wij u zich te laten vaccineren tegen griep.

Waarom vaccineren?

Patiënten met een verminderde afweer hebben een verhoogd risico op het krijgen van griep. Als zij griep hebben, lopen zij ook meer kans op het krijgen van ernstige complicaties ten gevolge van de griep. Dit geldt ook voor patiënten die met chemotherapie, immunotherapie of doelgerichte therapie behandeld worden vanwege een oncologische of hematologische aandoening. Door preventieve vaccinatie (grieprik) tegen het griepvirus kan het optreden van een ernstige griep meestal worden voorkomen.

Wat is de grieprik?

De grieprik is een vaccinatie tegen griep. Vanaf ongeveer twee weken na het plaatsen van de grieprik biedt deze bescherming. De bescherming duurt vier tot zes maanden. Vanaf oktober wordt ieder jaar gevaccineerd tegen de gebruikelijke seizoensgebonden griep. Hiervoor wordt een geïnactiveerd griepvaccin gebruikt. Deze is veilig voor patiënten met een verminderde weerstand. (Geïnactiveerde vaccin: Deze bevatten stammen van de bacterie of het virus die door warmte of chemicaliën zijn gedood. Zij zijn in staat om de aanmaak van antistoffen te stimuleren, maar zijn niet in staat om ziekte te veroorzaken.)

Kan ik na vaccinatie geen griep meer krijgen?

Vanwege de invloed van chemotherapie, immunotherapie of doelgerichte therapie op de afweer, is vaccinatie bij patiënten die behandeld worden met chemotherapie of immunotherapie meestal iets minder effectief dan bij gezonde mensen. Deze grieprik beschermt dus niet altijd tegen griep. Dit is echter geen reden om de vaccinatie niet te doen. Een uitzondering is de patiëntengroep die behandeld wordt met rituximab (Mabthera). Bij deze groep patiënten is vaccineren niet zinvol tot zes maanden na de laatste toediening van rituximab.

Wanneer vaccineren?

Het beste tijdstip van vaccinatie tijdens de behandeling met chemotherapie of immunotherapie is niet bekend. Tijdens de behandeling met chemotherapie adviseren wij de grieprik te laten toedienen enkele dagen voor een volgende kuur. U kunt de grieprik gratis halen bij uw huisarts.

Vragen?

Heeft u hierover vragen? Stel deze dan aan de oncologieverpleegkundige, verpleegkundig specialist of uw behandelend arts.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):	(013) 221 00 00
Polikliniek Interne Geneeskunde:	(013) 221 02 10
Locatie ETZ Elisabeth	
Route 25	
Locatie ETZ TweeSteden	
Route Polikliniekgebouw, Wachtruimte 1	
Locatie ETZ Waalwijk	
Route Wachtruimte 5, Nummer 26	
Dagbehandeling ETZ Elisabeth:	(013) 221 31 42
Dagbehandeling ETZ TweeSteden:	(013) 221 53 45