

De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te nemen:



- 1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of scan de QR code.
- 2 Download de app
- 3 Accepteer de push notificaties
- 4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
- 5 Selecteer de juiste behandeling en druk op 'Start'.

Welkom

Huidpriktest



Het onderzoek naar een allergische reactie kan met behulp van een priktest worden uitgevoerd.

Meer informatie over: Huidpriktest

Door middel van de priktest gaan we na of er sprake is van een allergische gevoeligheid voor allergenen. Allergenen komen onder andere in de lucht voor (zoals huisstofmijt, pollen en huidschilfers van dieren) en in voedingsmiddelen.

Vorbereiding

Belangrijk

Als u zwanger bent, of wanneer de conditie van u/uw kind is verslechterd (bijvoorbeeld koorts, kortademigheid of hartklachten) raden wij u aan van te voren contact op te nemen met ons om te beoordelen of de test door kan gaan.

Bij zwangerschap wordt de test uitgesteld.

Medicatie



Om de test goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u met de inname van een antiallergisch medicijn ten minste 4 dagen voor de provocatie stopt.

Zalven



Het smeren van zalven met corticosteroid moet u **7 dagen** vòòr de test stoppen. De dag van de test geen zalf of crème op de onderarmen of rug gebruiken.

Meer informatie over: Zalven

Met het smeren van zalven die corticosteroid bevatten moet u **7 dagen** vòòr de test stoppen. U mag uzelf dan nog wel insmeren met zalven zonder corticosteroid, zoals bodylotion, alleen niet op de armen en de rug de dag van de test.

Antiallergische medicijnen



Om de testen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u/uw kind met de inname van antiallergische medicijnen (tenminste) **4 dagen** voor de test stopt.

Extra informatie voorbereiding



Het is niet nodig om nuchter te komen voor de test.

Waar mag u zich melden?

Afspraak het Allergiecentrum



Met uw patiëntenpas kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuilen. Het allergiecentrum bevindt zich op locatie ETZ Elisabeth, route 35

Uitvoering huidpriktest

Uitvoering huidpriktest



Op de onderarmen krijgt u aan de handpalmzijde een genummerde plakbandstrook aangebracht. Het is belangrijk dat u op de dag van de test uw armen en rug niet insmeert met zalf of bodylotion.

Meer informatie over: Uitvoering van de huidpriktest

Naast de nummertjes wordt een druppeltje met verschillende testvloeistoffen gedruppeld. Daarna wordt, met behulp van een speciaal metalen prikkertje met een puntje van slechts 1 millimeter lengte, door de druppel in de huid geprikt. Zo wordt eerst één arm geprikt. Vervolgens volgt voor de andere arm dezelfde procedure.

Het is belangrijk dat u/uw kind niet krabt.

Als u/uw kind in het verleden neiging tot flauwvallen had of als u/uw kind erg tegen de test opziet, dient u dit van tevoren aangeven. Men kan hier dan rekening mee houden en eventueel kan de test liggend

worden uitgevoerd.

Huidreactie



Na 15 minuten leest de assistente de huidtest af.

Meer informatie over: Huidreactie

Er kan een huidreactie te zien zijn die bestaat uit een klein verheven bultje met daaromheen een rode hof, die fors kan jeuken. Op één van de testvloeistoffen (de histamine) hoort altijd een reactie te komen; deze geeft aan of de test betrouwbaar is geweest.

Bij grote reacties of heftige jeuk kan eventueel een antiallergisch tabletje gegeven worden. In sommige gevallen wordt de huid met hormoon zalf ingesmeerd.

De kans op een late huidreactie bij deze vorm van testen is zeer gering. In zeldzame gevallen kunnen patiënten allergische verschijnselen krijgen. Vanwege dit risico vragen wij u om na de huidpriktest 15 minuten te wachten. Voelt u zich na dit kwartier goed, dan kunt u naar huis.

Goed om te weten!

Om te voorkomen dat de druppeltjes van de huidtest wegglijden, is het belangrijk dat u op de dag van de test uw armen en rug niet insmeert met zalf of bodylotion.

Meer informatie over: Goed om te weten!

Om te voorkomen dat de druppeltjes van de huidtest wegglijden, is het belangrijk dat u op de dag van de test uw armen én rug niet insmeert met zalf of bodylotion. Indien de test niet mogelijk is op de armen kan het zijn dat de test op uw rug wordt uitgevoerd.

Daarnaast is niet nodig om nuchter te komen voor de test.

Extra informatie

Er kunnen ook huidtesten worden gezet met verse voedingsmiddelen. Het prikkertje wordt dan eerst in het voedingsmiddel (bijvoorbeeld appel) geprikt en vervolgens in de huid.

Uitslag

Uitslag

Tijdens de volgende afspraak bespreekt de allergoloog met u de uitslag. Hij/zij geeft toelichting op de resultaten van het onderzoek. Ook geeft de arts aan wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor uw kind.

Contact

Contact



Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Allergiecentrum.

Heeft u een ernstige allergische reactie na 17:00 uur, neem dan contact op met huisarts of huisartsenpost.

Meer informatie over: Contact

ETZ Elisabeth

Direct nummer

(013) 221 00 20

Openingstijden

Ma t/m vrij 8.30 - 17.00

Route

35

Anti-allergische medicatie

Antiallergische medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het heel belangrijk dat u/uw kind de inname van de volgende medicijnen 4 dagen voor de test stopt:

Tabletten

Algemene naam	Merksnaam
Acrivastine	Semprex ^o
Alimemazine	Nedeltran ^o
Cetirizine	Zyrtec ^o , Reactine ^o , Revalintabs ^o
Chloorcyclizine/cinnarizine	Primatour ^o
Cimetidine	Tagamet ^o
Cinnarizine	
Clemastine	Tavegil ^o
Cromoglicinezuur	Nalcrom ^o
Cyclizine	
Cyproheptadine	Periactin ^o
Desloratadine	Aerius ^o
Dexchlorfeniramine	Polaramine ^o
Dimenhydrinaat	
Dimetindeen	Fenistil ^o
Ebastine	Kestine ^o
Famotidine	Pepcid ^o , Pepcidin ^o
Fexofenadine	
Guaifenesine/natriumbenzoaat/oxomemazine	Toplexil ^o
Hydroxyzine	Atarax ^o
Ketotifen	Zaditen ^o
Levocetirizine	Xyzal ^o
Loratadine	Allerfre ^o , Claritine ^o
Mebhydroline	
Meclozine	Suprimal ^o
Meclozine/pyridoxine	Emesafene ^o
Mizolastine	Mizollen ^o
Montelukast	Singulair ^o
Nizatidine	Axid ^o
Oxatomide	Tinset ^o
Oxomemazine	Toplexil ^o
Promethazine	
Ranitidine	Zantac ^o
Ranitidinebismutcitraat	Pylorid ^o
Terfenadine	Triludan ^o

Zie afbeelding voor een overzicht van anti-allergische medicatie

Betablokkers

Bètablokkers

Indien u/uw kind zogenaamde Bètablokkers tabletten/oogdruppels gebruikt, dient u vooraf contact met de polikliniek Allergologie op te nemen.

Tabletten

Algemene naam	Merksnaam
Acebutolol	Sectral [°]
Atenolol	Tenormin [°]
Atenolol/chloortalidon	Tenoretic [°]
Atenolol/nifedipine	Niften [°]
Betaxolol	Kerlon [°]
Bisoprolol	Emcor [°]
Bisoprolol/hydrochloorthiazide	Emcoretic [°]
Carvedilol	Eucardic [°]
Celiprolol	Dilanorm [°]
Esmolol	Brevibloc [°]
Labetalol	Trandate [°]
Metoprolol	Lopresor [°] , Selokeen [°]
Metoprolol/hydrochloorthiazide	Selokomb [°]
Nebivolol	Nebilet [°]
Oxprenolol	
Pindolol	Viskeen [°]
Propranolol	Inderal [°]
Sotalol	Sotacor [°]

Oogdruppels

Algemene naam:	Merksnaam
Betaxolol	Betoptic [°]
Bimatoprost/timolol	Ganfort [°]
Brimonidine/timolol	Combigan [°]
Carteolol	Teoptic [°] , Arteoptic [°] , Carteabak [°]
Dorzolamide/timolol	Cosopt [°]
Latanoprost/timolol	Xalacom [°]
Levobunolol	Betagan liquifilm [°]
Metipranolol	Beta Ophtiole [°] (EDO)
Metipranolol/pilocarpine	Normoglaucan [°]
Pilocarpine/timolol	Timpilo [°]
Timolol	Loptomit [°] , Nyogel [°] , Timo-COMOD [°] , Timoptol [°]
Travoprost/timolol	Duotran [°]

Gebruikt u/uw kind Bètablokkers tabletten (voorgeschreven voor onder andere hartaandoeningen, hoge bloeddruk of migraine) of Bètablokkers oogdruppels (voorgeschreven voor hoge oogboldruk) en heeft u dit nog niet besproken met uw behandeld Allergoloog? Dan dient u voor de test contact op te nemen met de polikliniek Allergologie. Deze middelen kunnen namelijk een allergische reacties versterken en vormen daarom een risico op eventuele gevaarlijke reacties. De noodzaak van de test wordt heroverwogen en er wordt eventueel overlegd met uw behandelend arts of met de inname van deze medicatie tijdelijk gestopt kan worden (Nb. niet stoppen zonder overleg). Zie afbeelding voor een overzicht van Bètablokkers.