

Huidtest geneesmiddelen

De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te nemen:



- 1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of scan de QR code.
- 2 Download de app
- 3 Accepteer de push notificaties
- 4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
- 5 Selecteer de juiste behandeling en druk op 'Start'.

Welkom

Huidtest geneesmiddelen

Tijdens het gebruik van geneesmiddelen kunnen klachten optreden vanwege geneesmiddelovergevoeligheid. Een manier om dit te testen is een huidtest geneesmiddelen te doen. Aan de hand van de uitslag besluit de arts of het geneesmiddel gestopt moet worden, of dat het een volgende keer gebruikt mag worden.

Vorbereiding

Belangrijk

Als u zwanger bent, of wanneer de conditie van u/uw kind is verslechterd (denk aan koorts, kortademigheid of hartklachten) raden wij u aan van te voren contact op te nemen met het allergiecentrum om te beoordelen of de test kan doorgaan. Bij zwangerschap wordt de test uitgesteld.

Zalven



Het smeren van zalven met corticosteroid moet u 1 week vòòr de test stoppen. Op de dag van de test geen zalf of crème gebruiken op de onderarmen en rug.

Medicatie



Om de test goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u met de inname van een antiallergisch medicijn tenminste 4 dagen voor de test stopt.

Meer informatie over: Medicatie

Om de test goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u met de inname van een antiallergisch medicijn tenminste 4 dagen voor de test stopt. Gebruikt u Bètablokkers of antidepressiva? Klik dan op de onderstaande button voor belangrijke informatie.

Bètablokkers



Gebruikt u/uw kind Bètablokkers tabletten (voorgeschreven voor onder andere hartaandoeningen, hoge bloeddruk of migraine) of Bètablokkers oogdruppels (voorgeschreven voor hoge oogboldruk) en heeft u dit nog niet besproken met uw behandeld Allergoloog? Dan dient u voor de test contact op te nemen met de polikliniek Allergologie. Deze middelen kunnen namelijk een allergische reacties versterken en vormen daarom een risico op eventuele gevaarlijke reacties. De noodzaak van de test wordt heroverwogen en er wordt eventueel overlegd met uw behandelend arts of met de inname van deze medicatie tijdelijk gestopt kan worden (Nb. niet stoppen zonder overleg).

Het is niet nodig om nuchter te komen voor de test het wordt aanbevolen juist wel te ontbijten.

Antidepressiva

Een aantal antidepressiva kunnen een remmende werking hebben op de test. Als u antidepressiva gebruikt moet u vooraf dit aan de allergoloog doorgeven. U mag nooit zonder overleg stoppen met deze medicatie.

Anti-allergische medicatie



U dient vóór de test minimaal 4 dagen te stoppen met anti-allergische medicatie

Zie afbeelding voor een overzicht van anti-allergische medicatie.

Extra informatie



Het is niet nodig om nuchter te komen voor de test, het wordt juist aanbevolen om wel te ontbijten.

Waar mag u zich melden?

Waar mag u zich melden?



U mag zich melden op het Allergiecentrum, ETZ Elisabeth, route 35.

Uitvoering huidtest geneesmiddelen

Uitvoering huidtest geneesmiddelen

Vaak wordt er per keer één geneesmiddel getest, soms kunnen verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd getest worden. Vaak wordt eerst in een lage concentratie begonnen. Als er dan geen reactie te zien is, volgt een hogere concentratie (Dit is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat er een algehele reactie optreedt). Afhankelijk van het te testen medicijn wordt de test in priktest en/of intracutaan uitgevoerd.

Duur van de test

De huidtesten hebben allemaal een verschillende tijdsduur, dit kan variëren van 1 tot 3 uur.

Uitslag

Uitslag

Tijdens de volgende afspraak bespreekt de allergoloog met u de uitslag. Hij/zij geeft toelichting op de resultaten van het onderzoek en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor u of uw kind.

Contact

Contact



Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Allergiecentrum.

Heeft u een ernstige allergische reactie na 17:00 uur, neem dan contact op met huisarts of huisartsenpost.

Meer informatie over: Contact

ETZ Elisabeth

Direct nummer

(013) 221 00 20

Openingstijden

ma t/m vrij 8.30-17.00

Route

35

Bètablokkers

Indien u/uw kind zogenaamde Bètablokkers tabletten/oogdruppels gebruikt, dient u vooraf contact met de polikliniek Allergologie op te nemen.

Tabletten

Algemene naam	Merksnaam
Acebutolol	Sectral [°]
Atenolol	Tenormin [°]
Atenolol/chloortalidon	Tenoretic [°]
Atenolol/nifedipine	Niften [°]
Betaxolol	Kerlon [°]
Bisoprolol	Emcor [°]
Bisoprolol/hydrochloorthiazide	Emcoretic [°]
Carvedilol	Eucardic [°]
Celiprolol	Dilanorm [°]
Esmolol	Brevibloc [°]
Labetalol	Trandate [°]
Metoprolol	Lopresor [°] , Selokeen [°]
Metoprolol/hydrochloorthiazide	Selokomb [°]
Nebivolol	Nebilet [°]
Oxprenolol	
Pindolol	Viskeen [°]
Propranolol	Inderal [°]
Sotalol	Sotacor [°]

Oogdruppels

Algemene naam:	Merksnaam
Betaxolol	Betoptic [°]
Bimatoprost/timolol	Ganfort [°]
Brimonidine/timolol	Combigan [°]
Carteolol	Teoptic [°] , Arteoptic [°] , Carteabak [°]
Dorzolamide/timolol	Cosopt [°]
Latanoprost/timolol	Xalacom [°]
Levobunolol	Betagan liquifilm [°]
Metipranolol	Beta Ophtiole [°] (EDO)
Metipranolol/pilocarpine	Normoglaucan [°]
Pilocarpine/timolol	Timpilo [°]
Timolol	Loptomit [°] , Nyogel [°] , Timo-COMOD [°] , Timoptol [°]
Travoprost/timolol	Duotran [°]

Gebruikt u/uw kind Bètablokkers tabletten (voorgeschreven voor onder andere hartaandoeningen, hoge bloeddruk of migraine) of Bètablokkers oogdruppels (voorgeschreven voor hoge oogboldruk) en heeft u dit nog niet besproken met uw behandeld Allergoloog? Dan dient u voor de test contact op te nemen met de polikliniek Allergologie. Deze middelen kunnen namelijk een allergische reacties versterken en vormen daarom een risico op eventuele gevaarlijke reacties. De noodzaak van de test wordt heroverwogen en er wordt eventueel overlegd met uw behandelend arts of met de inname van deze medicatie tijdelijk gestopt kan worden (Nb. niet stoppen zonder overleg).

Het is niet nodig om nuchter te komen voor de test het wordt aanbevolen juist wel te ontbijten.

Antidepressiva

Een aantal antidepressiva kunnen een remmende werking hebben op de test. Als u antidepressiva gebruikt moet u vooraf dit aan de allergoloog doorgeven. U mag nooit zonder overleg stoppen met deze medicatie.

Anti-allergische medicatie

Antiallergische medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het heel belangrijk dat u/uw kind de inname van de volgende medicijnen 4 dagen voor de test stopt:

Tabletten

Algemene naam	Merksnaam
Acrivastine	Semprex ^o
Alimemazine	Nedeltran ^o
Cetirizine	Zyrtec ^o , Reactine ^o , Revalintabs ^o
Chloorcyclizine/cinnarizine	Primatour ^o
Cimetidine	Tagamet ^o
Cinnarizine	
Clemastine	Tavegil ^o
Cromoglicinezuur	Nalcrom ^o
Cyclizine	
Cyproheptadine	Periactin ^o
Desloratadine	Aerius ^o
Dexchlorfeniramine	Polaramine ^o
Dimenhydrinaat	
Dimetindeen	Fenistil ^o
Ebastine	Kestine ^o
Famotidine	Pepcid ^o , Pepcidin ^o
Fexofenadine	
Guaifenesine/natriumbenzoaat/oxomemazine	Toplexil ^o
Hydroxyzine	Atarax ^o
Ketotifen	Zaditen ^o
Levocetirizine	Xyzal ^o
Loratadine	Allerfre ^o , Claritine ^o
Mebhydroline	
Meclozine	Suprimal ^o
Meclozine/pyridoxine	Emesafene ^o
Mizolastine	Mizollen ^o
Montelukast	Singulair ^o
Nizatidine	Axid ^o
Oxatomide	Tinset ^o
Oxomemazine	Toplexil ^o
Promethazine	
Ranitidine	Zantac ^o
Ranitidinebismutcitraat	Pylorid ^o
Terfenadine	Triludan ^o

U dient vóór de test minimaal 4 dagen te stoppen met anti-allergische medicatie

Zie afbeelding voor een overzicht van anti-allergische medicatie.