

Huidtest insect (bij-wesp)

De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te nemen:



- 1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of scan de QR code.
- 2 Download de app
- 3 Accepteer de push notificaties
- 4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
- 5 Selecteer de juiste behandeling en druk op 'Start'.

Welkom

Huidtest insect (bij-wesp)

Deze test wordt toegepast om te testen of mensen allergisch zijn voor een bij, en/of een wesp.

Vorbereiding

Medicatie



Om de testen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u/uw kind met de inname van antiallergische medicijnen (tenminste) 4 dagen voor de test stopt.

Goed om te weten!



Het is niet nodig om nuchter te komen voor de test, het wordt aanbevolen juist wel te ontbijten.

Uitvoering

Waar mag u zich melden?



U mag zich melden op het Allergiecentrum, ETZ Elisabeth, route 35.

Huidtest insect

Deze test wordt stapsgewijs uitgevoerd: er wordt met een heel lage concentratie begonnen en als er na 15 minuten geen reactie zichtbaar is op het allergeen, testen we met een hogere concentratie.

Uitslag

Na de test



Na deze 15 minuten zal de assistente de huidtest aflezen. Bij grote reacties of heftige jeuk kan eventueel een antiallergisch tabletje gegeven worden. In sommige gevallen wordt de huid met zalf ingesmeerd.

Contact

Contact



Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Allergiecentrum.
Heeft u een ernstige allergische reactie na 17:00 uur, neem dan contact op met huisarts of huisartsenpost.

Meer informatie over: Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Allergiecentrum.

ETZ Elisabeth

Direct nummer

(013) 221 00 20

Openingstijden

ma t/m vrij 8.30-17.00

Route

35

antiallergische medicijnen (tenminste) 4 dagen voor de test stopt. Gebruikt u Bètablokkers of antidepressiva? Klik dan op de onderstaande button voor belangrijke informatie.

Bètablokkers

Bètablokkers

Indien u/uw kind zogenaamde Bètablokkers tabletten/oogdruppels gebruikt, dient u vooraf contact met de polikliniek Allergologie op te nemen.

Tabletten

Algemene naam	Merknaam
Acebutolol	Sectral [°]
Atenolol	Tenormin [°]
Atenolol/chloortalidon	Tenoretic [°]
Atenolol/nifedipine	Niften [°]
Betaxolol	Kerlon [°]
Bisoprolol	Emcor [°]
Bisoprolol/hydrochloorthiazide	Emcoretic [°]
Carvedilol	Eucardic [°]
Celiprolol	Dilanorm [°]
Esmolol	Brevibloc [°]
Labetalol	Trandate [°]
Metoprolol	Lopresor [°] , Selokeen [°]
Metoprolol/hydrochloorthiazide	Selokomb [°]
Nebivolol	Nebilet [°]
Oxprenolol	
Pindolol	Viskeen [°]
Propranolol	Inderal [°]
Sotalol	Sotacor [°]

Oogdruppels

Algemene naam:	Merknaam
Betaxolol	Betoptic [°]
Bimatoprost/timolol	Ganfort [°]
Brimonidine/timolol	Combigan [°]
Carteolol	Teoptic [°] , Arteoptic [°] , Carteabak [°]
Dorzolamide/timolol	Cosopt [°]
Latanoprost/timolol	Xalacom [°]
Levobunolol	Betagan liquifilm [°]
Metipranolol	Beta Ophtiole [°] (EDO)
Metipranolol/pilocarpine	Normoglaucou [°]
Pilocarpine/timolol	Timpilo [°]
Timolol	Loptomit [°] , Nyogel [°] , Timo-COMOD [°] , Timoptol [°]
Travoprost/timolol	Duotran [°]

Gebruikt u/uw kind Bètablokkers tabletten (voorgeschreven voor onder andere hartaandoeningen, hoge bloeddruk of migraine) of Bètablokkers oogdruppels (voorgeschreven voor hoge oogboldruk) en heeft u dit nog niet besproken met uw behandeld Allergoloog? Dan dient u voor de test contact op te nemen met de polikliniek Allergologie. Deze middelen kunnen namelijk een allergische reacties versterken en vormen

daarom een risico op eventuele gevaarlijke reacties. De noodzaak van de test wordt heroverwogen en er wordt eventueel overlegd met uw behandelend arts of met de inname van deze medicatie tijdelijk gestopt kan worden (Nb. niet stoppen zonder overleg).

Antidepressiva

Een aantal antidepressiva kunnen een remmende werking hebben op de test. Als u antidepressiva gebruikt moet u vooraf dit aan de allergoloog doorgeven. U mag nooit zonder overleg stoppen met deze medicatie.

Antiallergische medicatie

Antiallergische medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het heel belangrijk dat u/uw kind de inname van de volgende medicijnen 4 dagen voor de test stopt:

Tabletten

Algemene naam	Merksnaam
Acrivastine	Semprex ^o
Alimemazine	Nedeltran ^o
Cetirizine	Zyrtec ^o , Reactine ^o , Revalintabs ^o
Chloorcyclizine/cinnarizine	Primatour ^o
Cimetidine	Tagamet ^o
Cinnarizine	
Clemastine	Tavegil ^o
Cromoglicinezuur	Nalcrom ^o
Cyclizine	
Cyproheptadine	Periactin ^o
Desloratadine	Aerius ^o
Dexchlorfeniramine	Polaramine ^o
Dimenhydrinaat	
Dimetindeen	Fenistil ^o
Ebastine	Kestine ^o
Famotidine	Pepcid ^o , Pepcidin ^o
Fexofenadine	
Guaifenesine/natriumbenzoesaat/oxomemazine	Toplexil ^o
Hydroxyzine	Atarax ^o
Ketotifen	Zaditen ^o
Levocetirizine	Xyzal ^o
Loratadine	Allerfre ^o , Claritine ^o
Mebhydroline	
Meclozine	Suprimal ^o
Meclozine/pyridoxine	Emesafene ^o
Mizolastine	Mizollen ^o
Montelukast	Singulair ^o
Nizatidine	Axid ^o
Oxatomide	Tinset ^o
Oxomemazine	Toplexil ^o
Promethazine	
Ranitidine	Zantac ^o
Ranitidinebismutcitraat	Pylorid ^o
Terfenadine	Triludan ^o