

# Hydroxychloroquinesulfaat

## Plaquenil®

### Reumatologie

In overleg met u heeft uw behandelend arts u het geneesmiddel hydroxychloroquinesulfaat, ofwel Plaquenil® voorgeschreven. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw arts, verpleegkundig specialist, apotheker of verpleegkundig reumaconsulent terecht.

### Werking

Hydroxychloroquinesulfaat is een anti-reumaticum. Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor zwelling en pijn van de gewrichten en bovendien ochtendstijfheid. Hydroxychloroquinesulfaat heeft een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsbeschadigingen. Hydroxychloroquinesulfaat werkt langzaam; het kan drie tot zes maanden duren voordat effect merkbaar wordt. Uw arts adviseert u dan ook meestal om naast hydroxychloroquinesulfaat, tijdelijk andere pijnstillers en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

### Gebruik

Hydroxychloroquinesulfaat wordt toegediend in dragees van 200 mg en wordt in één of twee doseringen per dag ingenomen. U moet de dragees na de maaltijd of voor de nacht innemen met water en ze in hun geheel doorslikken.

### Bijwerkingen

Bij gebruik van hydroxychloroquinesulfaat kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

- Misselijkheid, braken en/of diarree; deze verschijnselen zijn meestal van voorbijgaande aard.
- Huiduitslag en jeuk; mede onder invloed van zonlicht.
- Sufheid, vermoeidheid en/of hoofdpijn.
- Oogproblemen hierdoor kan het zijn dat uw behandelend arts u doorverwijst naar een oogarts.

Als één of meerdere van bovenstaande verschijnselen bij u optreden, moet u contact opnemen met uw behandelend arts of huisarts.

### Aanvullende informatie

Hydroxychloroquinesulfaat wordt ook gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van malaria. Daarnaast wordt het toegepast bij andere reumatische aandoeningen, zoals Systemische Lupus Erythematoses.

### Invloed op een zwangerschap en borstvoeding

Overleg altijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap overweegt.

Hydroxychloroquinesulfaat kan indien nodig, op voorschrift van uw behandelend arts, tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.

## Invloed op een zwangerschap en borstvoeding

Overleg altijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap overweegt.

Hydroxychloroquinesulfaat kan indien nodig, op voorschrift van uw behandelend arts, tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt.

Als u meer informatie wilt over het medicijn hydroxychloroquinesulfaat verwijzen wij u naar de onderstaande link van ReumaNederland.

[Folder Hydroxychloroquine](#)

## Tot slot

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw arts, apotheker of reumaconsulent terecht.

## Belangrijke telefoonnummers

<b>ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):</b>	<b>(013) 221 00 00</b>
<b>Polikliniek Reumatologie:</b>	<b>(013) 221 03 80</b>

**Locatie ETZ Elisabeth**  
**Route 24**

**Locatie ETZ TweeSteden**  
**Afdeling 3A**