

Kaakabces

De inhoud van deze folder komt uit onze ETZ behandelwijzer app. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Welkom

Welkom

Tijdens een infectie in de kaak kan zich pus ophopen in het weefsel. Dit heet een abces. In deze app vind je alle info over het een kaakabces en de behandeling in het ETZ.

Meer informatie over: ETZ

Het ETZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.

Omdat iedere patiënt uniek is, bieden we zorg op maat. Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. 'Oog voor jou' noemen we dat.

Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij onze patiënten zorg die Buitengewoon is.

Behandeling van een kaakabces

Behandeling

Er is onder plaatselijke verdoving of onder algehele narcose, dit abces met een klein sneetje geopend, zodat pus weg kan lopen. Na de ingreep blijft er vaak een drain (blauw van kleur) achter in de wond.

Meer informatie over: Drain

De drain zorgt ervoor dat de wond open blijft, pus afgevoerd kan worden en bacteriën niet worden opgesloten. De drain wordt na ongeveer 5 dagen verwijderd.

Na de behandeling

Waar moet ik op letten?

Na een kaakabces is het belangrijk om een aantal dingen te weten.

Meer informatie over: Verdoving

De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het kan zijn dat de volgende verschijnselen zich voordoen:

- Een beetje nabloeden: het speeksel kan de eerste dag na de ingreep nog wat rood zijn.
- Napijn.
- Enige temperatuursverhoging.
- Het moeilijk openen van de mond en soms last met slikken
- Toename van de zwelling de eerste twee dagen is mogelijk.

Zwelling

De zwelling zal in de komende dagen langzaam gaan verdwijnen.

Er wordt geadviseerd:

- De zwelling voorzichtig te masseren (in de richting van de wond).
- Met het hoofd iets omhoog te slapen.
- Niet in de zon te gaan zolang de wang gezwollen is.

Wondverzorging

Het is normaal dat de wond wat nabloedt. Ga niet krachtig spoelen. Reinig het gebied van de wond voorzichtig met een zachte tandenborstel. De tanden kun je normaal poetsen. Mocht de drain spontaan loskomen, neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Mond-, kaak- en Aangezichts chirurgie.

Roken

De eerste vijf dagen na de behandeling mag je niet roken. Roken zorgt voor een slechte wondgenezing.

Pijnbestrijding

Heeft de MKA-chirurg geen pijnstiller voorgeschreven, dan kun je 1 a 2 tabletten paracetamol van 500 mg per stuk innemen, met een maximum van 3 gram (6 tabletten) per dag. Gebruik **geen** Aspirine® deze geven een grotere kans op nabloeding. Neem de pijnstiller voordat de verdoving is uitgewerkt, bijvoorbeeld direct bij thuiskomst.

Eten

Misschien kun je de eerste dag(en) na de behandeling moeilijker eten. In dat geval kunt je vloeibare voeding gebruiken. Het is beter om de eerste dagen geen warme dranken te gebruiken.

Complicaties

Neem telefonisch contact op met de polikliniek Mond-, kaak- en Aangezichts chirurgie als één van de volgende situaties zich voordoet:

- koorts boven de 38,5°C.
- een vieze smaak in uw mond.
- De pijn is niet meer door de pijnstillers te onderdrukken; deze helpen slechts een uur.
- Je maakt je zorgen.