

Longfunctie onderzoeken

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Longfunctie onderzoeken

Spirometrie / testduur: 10 minuten

Bij dit onderzoek wordt de inhoud van uw longen bepaald en de kracht waarmee u uitblaast. U blaast hiervoor enkele oefeningen.

Afspraakinstructie:

U hoeft niet te stoppen met longmedicatie

NB : Als u met de arts andere afspraken heeft gemaakt i.v.m. de medicatie, houdt u zich dan aan deze afspraken.

Spirometrie met farmacon / Testduur: 20 minuten

Bij dit onderzoek wordt de inhoud van uw longen bepaald en de kracht waarmee u uitblaast. U blaast hiervoor enkele oefeningen. Na het inademen van een medicijn wordt de meting herhaald.

Afspraakinstructie

Voor het onderzoek moet U stoppen met bepaalde longmedicatie, zie medicatieoverzicht hieronder.

Meer informatie over: Medicatielijst

Voor dit longonderzoek mag u bepaalde longmedicatie niet gebruiken. Hieronder kunt u zien met welke medicatie u wanneer moet stoppen.

NB : Als u met de arts andere afspraken heeft gemaakt i.v.m. de medicatie, houdt u zich dan aan deze afspraken.

6 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimimetica

Salbutamol

Airomir,

Ventolin

Terbutaline
Bricanyl
Fenoterol
Berotec
Rimiterol
Pulmadil

Anticholinergica

Ipratropium
Atrovent,
Ipraxa

Duale bronchusverwijders

Fenoterol/Ipratropium
Berodual
Salbutamol/Ipratropium
Combivent, Ipramol

12 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimimetica

Formoterol
Atimos, Foradil, Oxis
Serevent
Salmeterol
Theofylline
Theolair, theolin
Unilair

Anticholinergica

Aclidinium
Eklira

Duale bronchusverwijders

Formoterol/Aclidinium
Duaklir

ICS/LABA

Beclometason/Formoterol
Foster
Budesonide/Formoterol
Symbicort, Duosp,
Fluticason propionaat/Salmeterol
Seretide, Airflusal
Fluticason propionaat/Formoterol
Flutiform

24 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimimetica

Indacaterol

Onbrez
Olodaterol
Striverdi

Anticholinergica

Tiotropium
Spiriva
Glycopyrronium
Seebri
Umeclidinium
Incruse

Duale bronchusverwijders

Indacaterol/Glycopyrronium
Ultibro
Vilanterol/Umeclidinium
Anoro
Olodaterol/Tiotropium
Spiolto

ICS/LABA

Fluticason furoaat/Vilanterol
Relvar

ICS/LABA/LAMA

Fluticason/Umeclidinium/Vilanterol
Trelegy
Beclometason/Formoterol/Glucopyrronium
Trimbow

24 uur voor het onderzoek stoppen

Leukotriënantagonisten

Montelukast
Singulair

NO-meting / Testduur: 10 minuten

Bij dit onderzoek wordt bepaald of er mogelijke allergische ontstekingsreacties in de luchtwegen aanwezig zijn. Dit meten we d.m.v. een ademtest.

Afspraak instructie:

Voor het onderzoek moet u :

- **1 uur nuchter zijn.**
- **1 uur geen zware inspanning verrichten**
- **1 uur stoppen met roken.**

Histamineprovocatietest / Testduur: 45 minuten

Bij dit onderzoek wordt de gevoeligheid van uw luchtwegen bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van histamine, wat u via een vernevelingsapparaat inademt. Tussendoor wordt steeds de longfunctie bepaald. U kunt hierbij wat kortademig worden of hoestklachten krijgen, soms krijgt men last van heesheid. Indien nodig krijgt u een medicijn om de benauwdheid op te heffen.

Afspraak instructie:

Met de inname van bepaalde longmedicatie en antihistaminica moet u tijdelijk stoppen. Zie medicatieoverzicht hieronder.

Meer informatie over: Medicatielijst histamine provocatie

Hieronder leest u met welke anti-histamine medicatie u moet stoppen voor dit onderzoek.

NB : Als u met de arts andere afspraken heeft gemaakt i.v.m. de medicatie, houdt u zich dan aan deze afspraken.

4 dagen voor het onderzoek niet innemen

Acrivastine
Semprex
Levocabastine
Livocab
Alimemazine
Nedeltran
Levocettrizine
Xyzal
Azelastine
Allergodil, Otrivinneusallergie
Loratadine
Allerfre, Claritine
Cinnarizine
Cinnipirine
Mebhydroline
Incidal
Cinnarizine/chloorcylizine
Primatour
Meclozine
Suprimal
Cimetidine
Tagamet
Meclozine/pyridoxine
Emesafene
Clemastine
Tavigil
Mizolastine
Mizollen
Cettrizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop,
Montelukast
Singulair
Reactine
Nizatidine
Axid
Cyclizine
Marzine
Olopatadine
Opatanol
Cyproheptadine
Periactin
Oxatomide
Tinset
Desloratadine
Aerius, Neoclarityn
Oxomemazine
Dexchlorfeniramine
Polaramine
Promethazine
Phenergan
Dimenhydrinaat
Dramamine
Ranitidine
Zantac
Dimetindeen
Fenistil
Ranitidinebismutcitraat
Pylorid
Ebastine
Kestine
Rupatadine
Rupafin
Emedastine
Emadine
Terfenadine
Triludan
Fexofenadine
Telfast
Famotidine
Pepcid, Pepcidin
Guaifenisine/Natriumbenzoaat
Toplexil
Oxomemazine
Hydroxyzine
Atarax
Ketotifen
Zaditen, Altrabak

6 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimimetica

Salbutamol
Aiomir,
Ventolin
Terbutaline
Bricanyl
Fenoterol
Berotec
Rimiterol
Pulmadil

Anticholinergica

Ipratropium
Atrovent,
Ipraxa

Duale bronchusverwijders

Fenoterol/Ipratropium
Berodual
Salbutamol/Ipratropium
Combivent, Ipramol

12 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimimetica

Formoterol
Atimos, Foradil, Oxis
Serevent
Salmeterol
Theofylline
Theolair, theolin
Unilair

Anticholinergica

Aclidinium
Eklira

Duale bronchusverwijders

Formotorol/Aclidinium
Duaklir

ICS/LABA

Beclometason/Formoterol
Foster
Budesonide/Formoterol
Symbicort, Duoresp,
Fluticason propionaat/Salmeterol
Seretide, Airflusal
Fluticason propionaat/Formoterol

Flutiform

24 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimimetica

Indacaterol

Onbrez

Olodaterol

Striverdi

Anticholinergica

Tiotropium

Spiriva

Glycopyrronium

Seebri

Umeclidinium

Incruse

Duale bronchusverwijders

Indacaterol/Glycopyrronium

Ultibro

Vilanterol/Umeclidinium

Anoro

Olodaterol/Tiotropium

Spiolto

ICS/LABA

Fluticason furoaat/Vilanterol

Relvar

ICS/LABA/LAMA

Fluticason/Umeclidinium/Vilanterol

Trelegy

Beclometason/Formoterol/Glucopyrronium

Trimbow

24 uur voor het onderzoek stoppen

Leukotriëenantagonisten

Montelukast

Singulair

Alle informatie

Medicatielijst

Voor dit longonderzoek mag u bepaalde longmedicatie niet gebruiken. Hieronder kunt u zien met welke medicatie u wanneer moet stoppen.

NB : Als u met de arts andere afspraken heeft gemaakt i.v.m. de medicatie, houdt u zich dan aan deze afspraken.

6 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimimetica

Salbutamol
Airomir,
Ventolin
Terbutaline
Bricanyl
Fenoterol
Berotec
Rimiterol
Pulmadil

Anticholinergica

Ipratropium
Atrovent,
Ipraxa

Duale bronchusverwijders

Fenoterol/Ipratropium
Berodual
Salbutamol/Ipratropium
Combivent, Ipramol

12 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimimetica

Formoterol
Atimos, Foradil, Oxis
Serevent
Salmeterol
Theofylline
Theolair, theolin
Unilair

Anticholinergica

Aclidinium
Eklira

Duale bronchusverwijders

Formoterol/Aclidinium
Duaklir

ICS/LABA

Beclometason/Formoterol
Foster
Budesonide/Formoterol
Symbicort, Duoresp,
Fluticason propionaat/Salmeterol
Seretide, Airflusal
Fluticason propionaat/Formoterol
Flutiform

24 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimimetica

Indacaterol
Onbrez
Olodaterol
Striverdi

Anticholinergica

Tiotropium
Spiriva
Glycopyrronium
Seebri
Umeclidinium
Incruse

Duale bronchusverwijders

Indacaterol/Glycopyrronium
Ultibro
Vilanterol/Umeclidinium
Anoro
Olodaterol/Tiotropium
Spiolto

ICS/LABA

Fluticason furoaat/Vilanterol
Relvar

ICS/LABA/LAMA

Fluticason/Umeclidinium/Vilanterol
Trelegy
Beclometason/Formoterol/Glucopyrronium
Trimbow

24 uur voor het onderzoek stoppen

Leukotriënantagonisten

Montelukast
Singulair

Medicatielijst histamine provocatie

Hieronder leest u met welke anti-histamine medicatie u moet stoppen voor dit onderzoek.

NB : Als u met de arts andere afspraken heeft gemaakt i.v.m. de medicatie, houdt u zich dan aan deze afspraken.

4 dagen voor het onderzoek niet innemen

Acrivastine
Semprex
Levocabastine
Livocab
Alimemazine
Nedeltran
Levocetirizine
Xyzal
Azelastine
Allergodil, Otrivinneusallergie
Loratadine
Allerfre, Claritine
Cinnarizine
Cinnipirine
Mebhydroline
Incidal
Cinnarizine/chloorcylizine
Primatour
Meclozine
Suprimal
Cimetidine
Tagamet
Meclozine/pyridoxine
Emesafene
Clemastine
Tavigil
Mizolastine
Mizollen
Cetirizine
Zyrtec, Prevalin Allerstop,
Montelukast
Singulair
Reactine
Nizatidine
Axid
Cyclizine
Marzine

Olopatadine
Opatanol
Cyproheptadine
Periactin
Oxatomide
Tinset
Desloratadine
Aerius, Neoclarityn
Oxomemazine
Dexchlorfeniramine
Polaramine
Promethazine
Phenergan
Dimenhydrinaat
Dramamine
Ranitidine
Zantac
Dimetindeen
Fenistil
Ranitidinebismutcitraat
Pylorid
Ebastine
Kestine
Rupatadine
Rupafin
Emedastine
Emadine
Terfenadine
Triludan
Fexofenadine
Telfast
Famotidine
Pepcid, Pepcidin
Guaifenisine/Natriumbenzoaat
Toplexil
Oxomemazine
Hydroxyzine
Atarax
Ketotifen
Zaditen, Altribak

6 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimetica

Salbutamol
Airomir,
Ventolin
Terbutaline
Bricanyl
Fenoterol

Berotec
Rimiterol
Pulmadil

Anticholinergica

Ipratropium
Atrovent,
Ipraxa

Duale bronchusverwijders

Fenoterol/Ipratropium
Berodual
Salbutamol/Ipratropium
Combivent, Ipramol

12 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimimetica

Formoterol
Atimos, Foradil, Oxis
Serevent
Salmeterol
Theofylline
Theolair, theolin
Unilair

Anticholinergica

Aclidinium
Eklira

Duale bronchusverwijders

Formoterol/Aclidinium
Duaklir

ICS/LABA

Beclometason/Formoterol
Foster
Budesonide/Formoterol
Symbicort, Duoresp,
Fluticason propionaat/Salmeterol
Seretide, Airflusal
Fluticason propionaat/Formoterol
Flutiform

24 uur voor het onderzoek niet inhaleren

B-sympathicomimimetica

Indacaterol
Onbrez
Olodaterol
Striverdi

Anticholinergica

Tiotropium

Spiriva

Glycopyrronium

Seebri

Umeclidinium

Incruse

Duale bronchusverwijders

Indacaterol/Glycopyrronium

Ultibro

Vilanterol/Umeclidinium

Anoro

Olodaterol/Tiotropium

Spiolto

ICS/LABA

Fluticason furoaat/Vilanterol

Relvar

ICS/LABA/LAMA

Fluticason/Umeclidinium/Vilanterol

Trelegy

Beclometason/Formoterol/Glucopyrronium

Trimbow

24 uur voor het onderzoek stoppen

Leukotriëenantagonisten

Montelukast

Singulair

Versie